

CATALOGUE

D E S

PLANTES MÉDICINALES ET ÉCONOMIQUES,

SUivant leurs caractères génériques & spécifiques ,
conformément à la Méthode sexuelle du Chevalier
LINNÉ.

DÉMONTRÉES par le sieur ANTOINE BANAL
cadet , Jardinier Botaniste du jardin royal des
plantes de Montpellier.



A MONTPELLIER ;

Chez JEAN-FRANÇOIS PICOT , seul Imprimeur du
Roi & de la Ville , place de l'Intendance.



M. D C C. LXXXIV.

348241

PRÉFACE.

IL n'est point d'école de Médecine où la Botanique ne soit regardée comme une des branches les plus essentielles de l'art de guérir. L'étude de cette science n'a eu pendant long-temps pour objet que les plantes auxquelles on avoit reconnu des propriétés économiques ou médicinales. La curiosité des hommes ne se borna pas à ce petit nombre d'individus d'un règne qui fait le plus bel ornement de la surface de notre globe ; elle se porta sur tous les végétaux sans distinction. Des Savans du premier ordre s'occupèrent à les nommer & à les décrire. Mais comme ils ne les considérerent pas sous le même point de vue , comme les dénominations furent arbitraires , on auroit bientôt fini par ne plus s'entendre , si les BAUHINS , par leurs synonymies , les TOURNEFORT & les LINNÉ , par leurs systèmes , n'avoient débrouillé ce cahos capable de rébuter les plus intrépides Amateurs de la plus belle , de la plus agréable des sciences. Cependant les travaux précieux de ces grands Hommes , en en facilitant l'étude , n'en ont pas fait disparaître toutes les épines. La Botanique sera toujours longue & difficile à apprendre , parce que les individus qu'elle embrasse sont très - variés & très - nombreux. Aussi la plupart des jeunes gens qui se destinent à la pratique de la Médecine , de la Chirurgie , ou de la Pharmacie , se contentent de la connoissance des plantes usuelles. C'est pour la faciliter que j'ai fait imprimer ce Catalogue. Les plantes qui sont d'usage en Médecine ; & la plupart de celles qu'on emploie dans les Arts , y

sont rangées suivant l'ordre du *Systema naturæ* du Chevalier LINNÉ. Presque tous les Savans de l'Europe se réunissent en faveur du système sexuel de cet illustre Auteur. J'ai cru ne pouvoir mieux faire que de me conformer à d'aussi bons Modeles. J'ai emprunté les caractères génériques & les phrases spécifiques de l'Édition du *Systema Vegetabilium* de MURRAY & du *Systema Plantarum* de REICHARD. J'y ai joint les phrases de M. PITTON DE TOURNEFORT, & les noms François les plus connus de chaque plante. Je n'indique pas les noms Patois, parce que chaque Province ayant son idiome particulier, ces noms varient à l'infini. Plusieurs raisons m'ont décidé à ne faire aucune mention des propriétés des plantes. 1^o. Parce que mon objet est de faire connoître les plantes, & non d'indiquer leurs vertus. 2^o. Parce qu'une matière médicale, pour être bonne, doit spécifier les cas où chaque substance convient, les cas où elle est contr'indiquée, la maniere de l'employer, &c. & je ne me suis proposé que de faire un Catalogue des plantes usuelles & non un ou plusieurs gros volumes. 3^o. « Parce que les jeunes Botanistes, s'ils trouvent les propriétés réunies à la nomenclature, négligent souvent le caractère des végétaux pour s'attacher aux effets qu'ils sont capables de produire, & dont ils pourroient s'instruire par-tout ailleurs que dans les Herborisations (1) » ou dans un jardin. J'expose au commencement l'explication du nom des Classes de M. LINNÉ. Les bornes de ce petit Ouvrage ne me permettent pas de m'étendre sur les principes & sur la langue de la Botanique. Je ferai tous mes efforts pour en rendre l'intelligence facile à ceux qui m'honoreroient de leur présence & de leur attention à mon cours particulier.

(1) *Flore de Bourgogne par M. DURANDE.*

EXPLICATION du nom des classes du système de M. DE LINNÉ.

LE système du Chevalier DE LINNÉ est nommé le système sexuel, parce qu'il est fondé sur le sexe des plantes. Les étamines qui en font les parties mâles forment la première division en 24 classes. Le pistil qui est la partie femelle forme la seconde, c'est-à-dire la division de chaque classe en ordres. Chaque ordre renferme sous lui les genres & les espèces. Le nom des 24 classes est formé de deux mots grecs qui en expriment le caractère.

Classes.

I. Monandria. <i>Monos aner.</i>	Une étamine dans une fleur hermaphrodite.
II. Diandria. <i>Dis aner.</i>	Deux étamines dans une fleur hermaphrodite.
III. Triandria.	Trois étamines, &c.
IV. Tetrandria.	Quatre étamines.
V. Pentandria.	Cinq étamines.
VI. Hexandria	Six étamines.
VII. Heptandria.	Sept étamines.
VIII. Octandria.	Huit étamines.
IX. Enneandria.	Neuf étamines.
X. Decandria.	Dix étamines.
XI. Dodecandria.	Douze étamines.
XII. Icosandria. <i>Eicosi aner.</i>	Une vingtaine ou plus d'étamines attachées au calice.
Vingt maris,	

XIII.	Polyandria. <i>Polys.</i> Plusieurs.	Plus de vingt étamines attachées au réceptacle.
XIV.	Didynamia. <i>Dis dynamis.</i> Deux forces.	Quatre étamines dont deux grandes & deux petites.
XV.	Tetradynamia. <i>Tetra.</i> Quatre.	Six étamines dont quatre grandes & deux petites.
XVI.	Monadelphia. <i>Monos adelphos.</i> Un frere.	Plusieurs étamines réunies par leurs filets en un corps.
XVII.	Diadelphia. <i>Dis.</i> Deux.	Plusieurs étamines réunies par leurs filets en deux corps.
XVIII.	Polyadelphia. <i>Polys.</i> Plusieurs.	Plusieurs étamines réunies par leurs filets en trois ou plusieurs corps.
XIX.	Syngenesia. <i>Syn genesis.</i> Ensemble génération.	Plusieurs étamines réunies en forme de cylindre par les anthes ou sommets , rarement par filets.
XX.	Gynandria, <i>Gyne aner.</i> Femme mari.	Plusieurs étamines unies & attachées au pistil , sans adhérer au réceptacle.
XXI.	Monoecia. <i>Monos oikia.</i> Une maison.	Fleurs mâles & fleurs femelles séparées sur un même individu.
XXII.	Diœcia. <i>Dis oikia.</i> Deux maisons.	Fleurs mâles sur un individu , & fleurs femelles sur un autre de même espece.
XXIII.	Polygamia. <i>Polys gamos.</i>	Fleurs mâles sur une plante , Fleurs femelles sur une au-

Clases.

Plusieurs nôces. tre de même espece ; & fleurs hermaphrodites , tantôt sur l'une , tantôt sur l'autre.

XXIV. Cryptogamia. Fleurs renfermées dans le *Cryptos gamos*. fruit ou presque invisibles. cachées noces.

O R D R E S.

Les Ordres sont fondés sur le nombre des pistils dans les treize premières Clases. Ainsi le premier ordre d'une Classe comprend les fleurs qui n'ont qu'un pistil. Il se nomme *Monogynia*.
Monos gyne
 Une femelle.

Le second ordre comprend les fleurs qui ont deux pistils ; & *Digynia* , &c.
 ainsi de suite.

Enfin l'ordre des fleurs qui ont un certain nombre de pistils se nomme *Polygynia*.
 Plusieurs.

La XIV^e. Classe est divisée en deux ordres dont la distinction est tirée de la disposition des graines.

Gymnospermia.	Quatre semences nues , à dé-
<i>Gymnos sperma.</i>	couvert au fond du calice.
Nue semence.	
Angiospermia.	Semences renfermées dans un
<i>Angeion.</i>	péricarpe.
Vase.	

La XV^e. Classe se divise en deux ordres d'après la figure du péricarpe.

<i>Siliculosa.</i>	Le péricarpe presque arrondi.
<i>A petites siliques.</i>	
<i>Siliquosa.</i>	Le péricarpe allongé.
<i>A siliques.</i>	

Les Classes suivantes , depuis la seizeième jusqu'à la vingt-troisième inclusivement , à l'exception de la dix-neuvième , tirent la distinction de leurs ordres des caractères classiques de toutes les Classes qui les précédent. La dix-neuvième est divisée en six ordres. Les fleurs des cinq premiers sont toutes des fleurs composées.

<i>Polygamia æqualis.</i>	Les fleurons sont tous hermaphrodites , tant dans le disque que dans la circonférence de la fleur.
<i>Polygamie égale.</i>	

<i>Polygamia superflua.</i>	Fleurons hermaphrodites dans le disque , femellés dans la circonférence , tous fertiles.
-----------------------------	--


<i>Polygamia frustranea.</i>	Fleurons hermaphrodites dans le fausse disque , stériles à la circonférence.
------------------------------	--

<i>Polygamia necessaria.</i>	Fleurons hermaphrodites dans le disque dont la femelle est stérile. Femelles à la circonférence.
------------------------------	--

<i>Polygamia segregata.</i>	Fleurons de différentes espèces avec un calice , renfermés dans un calice commun.
-----------------------------	---

<i>Monogamia.</i>	Fleurs qui , sans être composées de fleurons , ont leurs étamines réunies par leurs anthes.
-------------------	---

Les ordres de la vingt-quatrième classe sont composés des familles naturelles : fougères , mousses , algues , champignons.



CATALOGUE DES PLANTES MEDICINALES ET ÉCONOMIQUES.

CLASSIS I. MONANDRIA.

Monogynia.

CANNA. cor. 6-pàrtita , erecta : labio 2-pàrtito ; revoluto. *Stylus* lanceolatus , corollæ adnatus. *Calyx* 3 - phyllus.

1. *Indica* foliis ovatis utrinque acuminatis nervosis.

BALISIER. *Cannacorus latifolius vulgaris*. T.

SALICORNIA. *cal. ventriculosus integer*. *Petala* 0. *sem.* 1.

2. *Fruticosa* caule erecto fruticoso.

SALICOR. *Salicornia geniculata semper vires* T,

CLASSIS II^a. DIANDRIA.*Monogynia.*

- JASMINUM.** cor. 5-fida. *bacca* dicocca. sem. arillata.
anther intrà tubum.
3. *Officinale.* foliis oppositis, foliolis distinctis. JASMIN.
Jasminum Vulgatius, flore albo T.
- LIGUSTRUM.** cor. 4-fida. *bacca* 4-sperma.
4. *Vulgare.* T. L. TROENE.
- PHILLYREA.** cor. 4-fida. *bacca* 1-sperma.
5. *Angustifolia.* Foliis linear-lanceolatis integerrimis.
FILARIA. A FEUILLES ÉTROITES. Phill. ligustri
folio. T.
6. *Latifolia.* fol. ovato-cordatis ferratis.
FILARIA A LARGES FEUILLES. Phill. latifol.
spinosa. T.
- OLEA.** cor. 4-fida : lacinis subovatis. *Drupa* 1 sperma.
7. *Europaea* fol. lanceolatis. OLIVIER. Olea sativa T.
- SYRINGA.** cor. 4-fida. Capsula bilocularis.
8. *Vulgaris* foliis ovato cordatis. **LILAC.** Lilac. T.
- CIRCÆA.** cor. 2-petala. cal. 2-phillus superus. sem.
1. biloculare.
9. *Luteiana:* L. T. caule erecto, racemis pluribus,
foliis ovatis. CIRCÉE.
- VERONICA.** cor. limbo 4-partito : lacinia iufimâ
angustiore. Capsula bilocularis.
10. *Officinalis.* Spicis lateralibus pedunculatis, foliis
oppositis, caule procumbente. VERONIQUE. THÉ
D'EUROPE.
- Veronica mas supina & vulgatissima T.
11. *Beccabunga* racemis lateralibus, foliis lanceolatis
ferratis caule erecto. VERONIQUE CRESSONNÉE.
Veronica aquatica major (& minor) folio ro-
tundo T.

12. *Anagallis.* racemis lateralibus , foliis lanceolatis serratis caule erecto . VERONIQUE A FEUILLES DE MOURON .
- Veronica aquatica major(& minor) folio oblongo T.
13. *Teucrium.* racemis lateralibus longissimis , foliis ovatis , rugosis , dentatis , obtusiusculis , caulis procumbentibus . VERONIQUE DES PRÉS . Veron. supina teucrri folio T.
14. *Chamædris.* racemis lateribus , foliis ovatis , sessiliibus , rugosis dentatis , caule bifarium piloso . VERO-N. A FEUILLES DE GERMANDRÉE . Ver. minor foliis imis rotundioribus . T.
- GRATIO LA.** cor. irregularis resupinata . Stam. 2
sterilia caps. 2-locularis . cal. 7-phyllosum :
2 exterioribus patulis .
15. *Officinalis* fol. lanceolatis serratis , floribus pendulatis . GRATIOLE ou HERBE AU PAUVRE HOMME . Digitalis minima gratiola dicta T.
- VERBENA.** cor. infundibuli formis subæqualis curva .
calycis unico dente truncato . sem. 2 s. 4 nuda .
Stamina 2 s. 4 .
16. *Officinalis.* tetrandra spicis filiformibus paniculatis foliis multifido laciñiatis , caule solitario .
VERVEINE . Verbena communis flore cœrulæ T.
- LYCOPUS.** cor. 4-fida . laciñia unica emarginata .
Stam. distantia . sem. 4 retusa .
17. *Europæus.* Foliis sinuato ferratis . PIED DE LOUP . Lycopus palustris glaber (& villosus) T.
- ROSMARINUS.** cor. inæqualis , labio superiore bipartito . Filamenta longa , curva , simplicia cum dente .
18. *Officinalis.* ROMARIN . Rosm. hortensis angustiore folio T.
- SALVIA.** cor. inæqualis . Filamenta transverse pedicello affixa .
19. *Officinalis* foliis lanceolato ovatis integris crenulatis floribus spicatis , calycibus acutis . SAUGE . Salvia major . Salvia minor aurita & non aurita T,

20. *Horminum*. Foliis obtusis crenatis, bracteis summis sterilibus majoribus coloratis.
ORMIN. horminum comâ purpuro violacea T.
21. *Verbenaca*. Foliis serratis sinuatis læviusculis, corollis calyce angustioribus.
HERBE AU PRUDHOMME. Horminum sylvestre la-vendulæ flore. T.
22. *Sclarea*. Foliis rugosis cordatis oblongis villosis serratis, bracteis coloratis calyce longioribus concavis acuminatis. **ORVALE.** TOUTE BONNE. *Sclarea tabern.* T.
23. *Æthiopis*. Foliis oblongis, erosis, lanatis, bracteis recurvatis subspinosis. **Gouan.** *Sclarea vulgaris lanuginosa amplissimo folio.* T.
SAUGE SINUÉE.

CLASSIS III^a. TRIANDRIA.*Monogynia.*

- V**ALERIANA. *cal. o. cor. 1-petala basi hinc gibba supera. sem. 1.*
24. *Officinalis*. Floribus triandris foliis omnibus pinnatis. **VALERIANE SAUVAGE.** Valeriana sylvestris major. V. S. M. altera folio lucido. Val. palustris. T.
25. *Phu.* floribus triandris foliis caulinis pinnatis, radicalibus indivisis. *Caulis non sulcatus R.* **GRANDE VALERIANE.** Valeriana hortensis. Phu. folio olusatri dioscoridis. T.
26. *Locusta* Floribus triandris, caule dichotomo, foliis linearibus. *Variet. 8. Descripsit R.* **MACHE BLANCHETTE.** Valerianella arvensis, præcox, humiliis, sem. compresso. T.
- TAMARINDUS.** *cal. 4-partitus. Petala 3, nectarium setis 2 brevioribus sub filamentis. Legumen pulposum.*

27. *Indica*. TAMARIN. Tamarindus. T.
CNEORUM. cal. 3-dentatus Petala 3. æqualia bacca
3 - cocca.
28. *Tricoccon*. CAMELÉE. Chamælea tricoccos T.
CROCUS. cor. 6-partita, æqualis, stigmata convoluta.
29. *Satiyus* spatha univalvi radicali, corolla tubo longissimo. SAFRAN. Crocus sativus. T.
- GLADIOCUS. cor. 6 - partita, ringens. Stam. adscendentia.
30. *Communis*. Foliis ensiformibus, floribus distantibus.
- GLAYEUL. Gladiolus floribus uno versu dispositis major & procerior. G. utrinq. floridus. T.
- IRIS. cor. 6-partita. Petalis alternis reflexis. Stigmata petaliformia.
31. *Florentina*. corollis barbatis, caule foliis altiore subbifloro, floribus sessilibus. IRIS DE FLORENCE. Iris alba Florentina. i. hortensis alba germanica. T.
32. *Germanica*. Corollis barbatis caule foliis altiore multifloro, floribus inferioribus pedunculatis. IRIS D'ALLEMAGNE. FLAMBE. Iris vulgaris germanica sive sylvestris. T.
33. *Pseud'Acorus*. corollis imberbibus, petalis interioribus stigmate minoribus, foliis ensiformibus. IRIS JAUNE. Iris palustris, lutea. T.
34. *Fætidissima*. Corollis imberbibus, petalis interioribus paientissimis, caule uniangulato, foliis ensiformibus. GLAYEUL PUANT. Iris fætidissima seu xyris. T.
35. *Tuberosa*. corollis imberbibus foliis tetragonis. HERMODATTE. Hermodactylus folio quadrangulo T.
- CYPERUS. Glumæ paleaceæ, distiche imbricatæ.
cor. o. sem. r. nudum.
36. *Longus*. culmo triquetro folioso, umbella foliosa supradecomposita, spiculis umbellato sessilibus. SOUCHET. Cyperus odoratus radice longâ, sive cyperus officinarum. T.

6 TRIANDRIA MONOGYNIA.

37. *Rotundus* culmo triquetro subnudo umbella decomposita : spicis alternis linearibus. SOUCHET ROND. *Cyperus rotundus vulgaris*. T.

Digynia.

- SACCHARUM. *cal.* lanugo longa extra calycem ,
cor. 2-valvis.

38. *Officinarum*. Floribus paniculatis , foliis planis.
CANNE A SUCRE. Arundo saccharifera. T.

- PHALARIS. *cal.* 2 - valvis , carinatus , longitudine æqualis , corollam includens.

39. *Canariensis*. Panicula subovata spiciformi , glumis carinatis. BLED DE CANARIE. Gramen spicatum semine iniliaceo albo. T.

- PANICUM. *Cal.* 3-valvis : valvula tertia minima.

40. *Italicum*. spica composita , spiculis glomeratis setis immixtis pedunculis hirsutis. PANIS CULTIVÉ. p. italicum panicula majore. T.

41. *Dactylon*. spicis digitatis patentibus : basi interiore villosis , floribus solitariis , sarmientis repentibus. CHIENDENT. Gramen dactylon radice repente sive officinarum. T.

42. *Miliaceum* panicula laxa flaccida , foliorum vaginis hirtis , glumis micronatis , nervosis. MILLET. Milium semine luteo. M. sem. albo. T.

- AVENA. *cal.* 2-valvis , multiflorus : arista dorsali contorta.

43. *Sativa*. Paniculata , calycibus dispermis , seminibus lævibus altero aristato. AVOINE CULTIVÉE. Avena nigra. Av. alba. T.

- ARUNDO. *cal.* 2-valvis. Flosculi congesti , lana cincti.

44. *Donax* calycibus 5-floris , panicula diffusa , culmo fruticoso. ROSEAU. Arundo sativa , quæ donax dioecoridis. T.

- LOLIUM. *cal.* 1-phillus , fixus , multiflorus.

45. *Perenne*. Spica mutica , spiculis compressis multifloris. IVROIE VIVACE. Gramen loliaceum , angustiore folio & spica. T.

46. *Temulentum* spica aristata , spiculis compressis multifloris. IVROIE DES BLEDS. Gramen loliaceum spica longiore aristas habens. T.
- SECALE. *cal.* oppositus , 2-valvis , 2-florus solitarius.
47. *Cereale* glumarum ciliis scabris. SEIGLE. Secale hypernum vel majus. S: Vernum vel minus. T.
- HORDEUM. *cal.* lateralis , bivalvis , uniflorus , ternus.
48. *Vulgare*. flosculis omnibus hermaphroditis aristatis : ordinibus duobus erectioribus. ORGE. Hordeum polystichum vernum. T.
49. *Distichon*. Flosculis lateralibus masculis muticis , semiibus angularibus imbricatis. L. T.
- TRITICUM. *cal.* bivalvis , solitarius , subtriflorus. *Flos* obtusiusculus acutus.
50. *Hypernum*. calycibus quadrifloris ventricosis lævibus imbricatis submuticis. FROMENT. TOUZELLE. Triticum hypernum aristis carens. T.
51. *Monococcum* calycibus subtrifloris : primo aristato , intermedio sterili. EPAUTRE. Hordeum distichum , spica nitida , zea seu briza nuncupatum. T.
52. *Repens*. calycibus quadrifloris subulatis acuminatis , foliis planis. FROMENT RAMPANT. CHIENDENT. Gramen loliaceum radice repente seu gramen officinariu. T.
-

CLASSIS IV^a. TETRANDRIA.*Monogynia.*

- G**LOBULARIA. *cal.* communis imbricatus ; proprius tubulatus , inferus. *Corollulae* labio superiore 2-partito : inferiore tripartito. *Receptaculum* paleaceum.
53. *Alypum* caule fruticoso , foliis lanceolatis tridentatis integrisque. TURBITH BLANC. SENÉ DES

PROVENÇAUX. Glob. fruticosa myrti folio tridentato. T.

54. *Vulgaris*. Caule herbaceo , foliis radicalibus tridentatis , caulinis lanceolatis. L. T. GLOBULAIRE.

DIPSACUS. cal. communis polyphyllus : proprius superus. Receptac. palacem.

55. *Fullonum*. foliis sessilibus serratis. CHARDON A FOULON. Dipsacus sativus. D. Sylvestris aut virga pastoris major. T.

SCABIOSA. cal. communis polyphyllus : proprius duplex superus. Recept. paleaceum s. nudum.

56. *Succisa* corollulis 4-fidis æqualibus , caule simplici , ramis approximatis , foliis lanceolato-ovatis. REMORS. MORSURE DU DIABLE. Scabiosa folio integro hirsuto. S. fol. int. glabro. T.

57. *Arvensis* corollulis quadrifidis radiantibus , foliis pinnatifidis incisis , caule hispido. SCABIEUSE. Scabiosa pratensis hirsuta quæ officinarum. T.

GALIUM. cor. 1-petala , plana. sem. subrotunda.

58. *Verum* foliis octonis linearibus sulcatis , ramis floriferis brevibus. CAILLE LAIT JAUNE. Gallium luteum. T.

59. *Aparine*. foliis octonis lanceolatis , carinis scabris retrorsum aculeatis , geniculis villosis , fructibus hispidis. GRATTERON. Aparine vulgaris. T.

RUBIA. cor. 1-petala , campanulata. Baccæ 2. monoperinæ.

60. *Tinctorum*. foliis annuis . caule aculeato. GARENCE. Rubia tinctorum sativa. R. sylvestris monspessulana major. T.

PLANTAGO. cal. 4-fidus. cor. 4 fida : limbo reflexo. Stam. longissima. Caps. 2-locularis , circumscissa.

61. *Major*. Foliis ovatis glabris , scapo tereti , spica flosculis imbricatis. GRAND PLANTAIN. Plantago latifolia sinuata. T.

62. *Lanceolata* foliis lanceolatis , spica sub-ovata nuda , scapo

TETRANDRIA MONOGYNIA. 9

scapo angulato. PLANTAIN LANCEOLÉ. Plantago angustifolia major . . . minor , &c. T.

63. *Coronopi-folia*. Foliis linearibus dentatis , scapo tereti. PLANTAIN CORNE DE CERF. Coronopus hortensis. T.
64. *Psyllium*. caule ramoso herbaceo , foliis subdentatis recurvatis capitulis aphyllis. HERBE AUX PU CES ANNUELLE. Psyllium majus erectum. T.
65. *Cynops*. caule ramoso suffruticoso , foliis integerimis filiformibus strictis , capitulis subfoliatis. HERBE AUX PU CES VIVACE. Psyllium majus supinum. T.

SANGUISORBA. *cal.* 2 - phyllus. *Germen* inter caly- cem corollamque.

66. *Officinalis*. Spicis ovatis. GRANDE PIMPRENELLES Pimpinella sanguisorba major. T.

CORNUS. *Involucrum* 4-phylum sæpiùs. *Petala* su- pera 4. *Drupa* nucleo biloculari.

67. *Mascula*. Arborea , umbellis involucrum æquanti- bus. CORNOULLIER MALE. Cornus hortensis (& sylvestris) mas.

68. *Sanguinea*. arborea , cymis nudis , ramis rectis. CORNOULLIER SANGUIN. Cornus femina. T.

CAMPHOROSMA. *cal.* urceolatus , dentibus 2 op- positis alternisque minimis. *cor.* nulla. *caps.* 1-sperma.

69. *Monspeliaca*. Foliis hirsutis linearibus. CAMPHRÉE. Camphorata hirsuta. T.

ALCHEMILLA. *cal.* 8-fidus. *cor.* o. *sem.* 1.

70. *Vulgaris*. Foliis lobatis. PIED DE LION. Alchimilla vulgaris. al. minor. T.

Digynia.

CUSCUTA. *cal.* 4-fidus. *cor.* 1-petala. *caps.* 2-locularis.

71. *Europæa*. Floribus sessilibus. CUSCUTE. Cuscuta major. C. minor. T.

Tetragynia.

ILEX. *cal.* dentatus. *cor.* rotata. Stylus o. *Bacca* 4-
spérima.

72. *Aquifolium*. foliis ovatis acutis spinosis. HOUX ÉPI-
NÉUX. *Aquifolium* sive *agrifolium vulgo*. T.

CLASSIS V^a. PENTANDRIA.*Monogynia.*

HELIOTROPIUM. *cor.* hypocrateriformis , 5-
fida , interjectis dentibus :
fauce nuda.

73. *Europæum*. foliis ovatis integerrimis tomentosis
rugosis , spicis conjugatis. HERBE AUX VERRUES.
Heliotropium majus dioscoridis. T.

LITHOSPERMUM. *cor.* infundibuliformis fauce per-
forata nuda , *cal.* 5-partitus.

74. *Officinale*. seminibus lœvibus , corollis vix calycem
superantibus , foliis lanceolatis. GREMIL. HERBE
AUX PERLES. Lith. *majus* erectum. T.

75. *Purpuro - cœrulæum*. seminibus lœvibus , corollis
calycem multoties superantibus. GREMIL VIOLET.
Lithops. minus repens latifolium. T.

ANCHUSA. *cor.* infundibuliformis fauce clausa forni-
cibus. *sem. basi insculpta.*

76. *Officinalis*. Foliis lanceolatis , spicis imbricatis se-
secundis. BUGLOSSE. *Buglossum angustifolium* ma-
jus , flore albo.... flore rubro aut variegato. Bugl.
sylvestre majus nigrum. T.

77. *Tinctoria*. tomentosa , foliis lanceolatis obtusis ,
staminibus corolla bterioribus. ORGANETTE. *Bug-
lossum radice rubra* , sive *anchusa vulgatior* ,
floribus cœrulæis . . . floribus albis. T.

PENTANDRIA MONOGYNIA. II

CYNOGLOSSUM. cor. infundibulif. fauce clausa fornicibus. sem. depressa ; interiore tantum latere stylo affixa.

78. *Officinale*. Staminibus corolla brevioribus, foliis lato-lanceolatis tomentosis sessilibus. LANGUE DE CHIEN. Cynoglossum majus vulgare. T.

PULMONARIA. cor. infundib. fauce pervia. cal. prismatico - 5 - gonus.

79. *Officinalis* foliis radicalibus ovato-cordatis scabris. PULMONAIRE. Pulm. Italicum ad Buglossum accedens. T.

SYMPHYTUM. corollæ limbus tubulato ventricosus : fauce clausa radiis subulatis.

80. *Officinale*. foliis ovato-lanceolatis decurrentibus. GRANDE CONSOUDE. Symphytum consolida major. T.

81. *Tuberosum*. foliis semidecurrentibus, summis oppositis. CONSOUDE TUBEREUSE. Symph. tuberosa radice majus (& minus.) T.

BORAGO. cor. rotata : fauce radiis clausa.

82. *Officinalis* foliis omnibus alternis, calycibus patentibus. BOURRACHE. Borago floribus cœrulæis (& albis) T.

ECHIUM. cor. irregularis, fauce nuda.

83. *Vulgare*. caule tuberculo hispido, foliis caulinis lanceolatis hispidis, floribus spicatis lateralibus. VIPERINE. Echium vulgare. T.

PRIMULA. Involucrum umbellulæ. Corollæ tubus cylindricus : ore patulo.

84. *Veris*. fol. dentatis rugosis. PRIMEVERE. Primula veris odorata flore luteo simplici. T.

85. *Auricula*. foliis ferratis glabris. OREILLE D'OURS. Auricula urisi. T.

CYCLAMEN. cor. rotata, reflexa, tubo brevissimo : fauce prominenté. Bacca tecta capsula.

86. *Europæum*. Corolla retroflexa. PAIN DE POURCEAU. Cyclamina sere omnia. T.

MENIANTHES. cor. hirsuta. Stigma 2-fidum. caps. 1-locularis.

87. *Trifoliata*. foliis ternatis. TREFLE DEAU. Menyanthes palustre latifolium (& angustifolium.) T.
- LYSIMACHIA**. cor. rotata. caps. globosa , inucronata 10-valvis.
88. *Vulgaris*. paniculata , racemis terminalibus. CORNEILLE. CHASSE BOSSE. Lysim. lutea major. T.
89. *Nummularia*. foliis subcordatis , floribus solitariis , caule repente. HERBE AUX ECUS. Lysim. humifusa folio rotundiore , flore luteo. T.
- ANAGALLIS**. cor. rotata. capsula circumscissa.
90. *Arvensis*. fol. indivisis , caule procumbente. MOURON. anag. flore phœnico (& cœrulæo.) T.
- PLUMBAGO**. cor. infundibulif. Siam. squammis basin corollæ claudentibus inserta. stigma 5-fidum sem. 1. oblongum , tunicatum.
91. *Europæa*. fol. amplexicaulibus lanceolatis scabris. DENTELAIRE. Plumbago quorundam. T.
- CONVOLVULUS**. cor. campanulata plicata. stigmata 2 caps. 2 - locularis , loculis dispermis.
92. *Arvensis*. foliis sagittatis utrinque acutis , pedunculis sub uni-floris. PETIT LISERON. conv. minor arvensis. T.
93. *Sepium*. foliis sagittatis postice truncatis , pedunculis tetragonis unifloris. LISERON DES HAIES. conv. major albus T.
94. *Scammonea*. foliis sagittatis postice truncatis , pedunculis teretibus subtrifloris. SCAMMONÉE. convolv. syriacus & scammonia syriaca. T.
95. *Soldanella*. foliis reniformibus , pedunculis unifloris. CHOUMARIN. Conv. maritim. nostras rotundifol. T.
- CAMPANULA**. cor. campanulata , fundo clauso valvis staminiferis. stigma 3-fidum. caps. infera poris lateralibus dehiscens.
96. *Rapunculus*. foliis undulatis ; radicalibus lanceolato ovalibus , panicula coarctata. RAIPONCE. camp. radice esculenta , flore cœrulæo (& candidante.) T.

97. *Trachelium.* caule angulato, foliis petiolatis, calycibus ciliatis, pedunculis trifidis. CAMPANULLE GANTELÉE. camp. vulgatior fol. urticæ, vel major & asperior, flore candido.
- PHYTEUMA. cor. rotata laciniis linearibus, 5-partita. *Stigma* 2. f. 3-fidum *caps.* 2. f. 3-locularis infera.
98. *Spicata,* Spica oblonga, capsulis bilocularibus, foliis radicalibus cordatis. RAIPONCE EN ÉPI. Ranunculus spicatus. T.
- SAMOLUS. cor. hypocrateriformis. Stam. munita squamulis corollæ. *caps.* 1-locularis, infera.
99. *Valerandi.* L. T. MOURON D'EAU.
- LONICERA. cor. 1-petala, irregularis. *bacca* polysperma 2-locularis, infera.
100. *Caprifolium.* Floribus verticillatis terminalibus sessilibus, foliis summis connato-perfoliatis. CHEVREFEUILLE DES JARDINS. caprifol. italicum. T.
101. *Periclymenum.* capitulis ovatis imbricatis terminalibus, foliis omnibus distinctis. CHEVREFEUILLE DES BOIS. Caprifol. germanicum. T.
- MIRABILIS. cor. infundib. supera. cal. inferus. Nectarium globosum, germen includens.
102. *Dichotoma.* Floribus sessilibus axillaribus erectis solitariis. BELLE DE NUIT. Jalappa parvo flore. T.
103. *Jalappa.* Floribus congestis terminalibus erectis. JALAP. Jalappa flore purpureo & seq. T.
- CORIS. cor. 1-petala, irregularis, calyx spinosus. *caps.* 5-valvis supera.
104. *Monspeliensis.* Coris cærulæa maritima. T. CORIS.
- VERBASCUM. cor. rotata, subinæqualis, *caps.* 2-locularis 2-valvis.
105. *Thapsus.* foliis decurrentibus utrinque tomentosis caule simplici. BOUILLON BLANC. Verbascum mas latifolium luteum. T.
106. *Nigrum.* Foliis cordato oblongis petiolatis. BOUILLOON NOIR. Verbascum nigrum flore ex luteo purpurascente. T.

- 107. Blattaria.** Foliis amplexicaulibus oblongis glabris, pedunculis solitariis. HERBE AUX MITTES. Blattaria lutea folio longo laciniato. T.
- DATURA.** cor. infubul. plicata. cal. tubulosus, angulatus, deciduus. caps. 4-valvis.
- 108. Ferox.** Pericarpiis spinosis erectis ovatis : spinis summis maximis convergentibus. POMME ÉPINEUSE DU PEROU. Stramonium ferox. T.
- 109. Stramonium.** pericarpiis spinosis erectis ovatis, foliis ovatis glabris. ENDORMIE. POMME ÉPINEUSE. Stramonium fructu spinoso oblongo, flore albo. T.
- 110. Metel.** Pericarpiis spinosis nutantibus globosis foliis cordatis sub integris pubescentibus. ENDORMIE A FEUILLES ENTIERES. Stramonium fructu spinoso, rotundo, flore albo, simplici. T.
- HYOSCIAMUS.** cor. infundibulif. obtusa. Stam. inclinata. caps. operculata, 2-locularis.
- 111. Niger.** Foliis amplexicaulibus sinuatis, floribus sessilibus. JUSQUIAME. HANNEBANE. Hyoscyamus vulgaris, vel niger. T.
- 112. Albus.** Foliis petiolatis sinuatis obtusis, floribus sessilibus. JUSQUIAME BLANCHE. Hyosc. albus major & minor. T.
- NICOTIANA.** cor. infundibul. limbo plicato. stam. inclinata. caps. 2-valvis 2-locularis.
- 113. Tabacum.** Foliis lanceolatis subpetiolatis amplexicaulibus, floribus acutis, caule frutescente. TABAC. PÉTUN. NICOTIANE. Nicotiana major latifolia. T.
- 114. Rustica.** Foliis petiolatis ovatis integerrimis, floribus obtusis. PRIAPÉE. HERBE A LA REINE. Nicotiana minor. T.
- 115. Glutinosa.** Foliis petiolatis cordatis integerrimis, floribus racemosis secundis subringentibus. NICOTIANE GLUANTE.
- ATROPA.** cor. campanulata. stam. distantia. baccæ globosa 2-locularis.

116. *Mandragora.* acaulis, scapis unifloris. MANDRAGORE MALE. Mandr. fructu rotundo. T.
117. *Belladona.* caule herbaceo, foliis ovatis integris. BELLADONE. Belladona majoribus foliis & floribus. T.
- PHYSALIS.** cor. rotata. stam. conniventia. bacca intrà calycem inflatum, bilocularis.
118. *Alkekengi.* Foliis geminis integris acutis, caule herbaceo interne subramoso. COQUERET. Alkekengi officinarum. T.
- SOLANUM.** cor. rotata. antheræ sub coalitæ apice poro gemino dehiscentes. bacca 2-locularis.
119. *Dulcamara.* caule inermi frutescente flexuoso, foliis superioribus hastatis, racemis cymosis. MORRELLE GRIMPANTE. DOUCE. AMERE. Solanum scandens, seu dulcamara. T.
120. *Tuberosum.* caule inermi herbaceo, foliis pinnatis integerrimis, pedunculis subdivisis. POMME DE TERRE. BATTATE DE VIRGINIE. Solanum tuberosum esculentum. T.
121. *Lycopersicum.* caule inermi herbaceo, foliis pinnatis incisis, racemis simplicibus. POMME D'AMOUR. Lycopersicon galeni. T.
122. *Nigrum.* caule inermi herbaceo, foliis ovatis dentato angulatis, racemis distichis nutantibus. MORRELLE A FRUIT NOIR. Solanum officinarum acinis nigricantibus. T.
123. *Melongena.* caule inermi herbaceo, foliis ovatis tomentosis, pedunculis pendulis incrassatis, calycibus inermibus. MAYENNE. AUBERGINE. Melongena fructu oblongo violaceo, &c.
- CAPSICUM.** cor. rotata. bacca. exfucca.
124. *Annum.* caule herbaceo, pedunculis solitariis. PIMENT. CORAIL DES JARDINS. Capsicum siliquis longis, propendentibus. T.
- RHAMNUS.** cal. tubulosus: squamis stamina munientibus. cor. nulla. bacca.
125. *Catharticus.* spinis terminalibus, floribus quadri-

16 PENTANDRIA MONOGYNIA.

fidis dioicis, foliis ovatis. NERPRUN. BOURGEPI-
NE. Rhamnus catharticus. T.

126. *Frangula*. inermis, floribus monogynis herma-
phroditis, foliis integerriinis. AULNE NOIR. BOUR-
GENE. Frangula. T.

127. *Alaternus*. inermis, floribus dioicis, stigmate tri-
plici, foliis ferratis. ALATERNE. Alaternus. T.

128. *Paliurus*. aculeis geminatis: inferiore reflexo,
floribus trigynis. PALIURE. Paliurus. T.

129. *Zizyphus*. aculeis geminatis: alterno recurvo,
floribus digynis, foliis ovato-oblongis. JUJUBIER.
Ziziphus. T.

EVONYMUS. cor. 5-petala. caps. 5-gona, 5-locula-
ris, 5-valvis, colorata. sem. calyprata.

130. *Europaeus*. floribus plerisque quadrifidis, foliis
sessilibus. FUSAIN. BONNET DE PRETRE. Evony-
mus vulgaris granis rubentibus. T.

RIBES. Petala 5. & stamina calyci inserta. Stylus 2-
fidus. bacca polysperma infera.

131. *Rubrum*. inerme, racemis glabris pendulis, flori-
bus planiusculis. GROSEILLER A FRUIT ROUGE.
Grossularia multiplici acino, sive non spinosa,
hortensis rubra sive ribes officinarum. T.

132. *Nigrum*. inerme, racemis pilosis, floribus oblon-
gis. CASSIS. Grossularia non spinosa, fructu nigro
majore. T.

133. *Uva crista*. ramis aculeatis, baccis glabris, pedi-
cellis bracteâ monophillâ. GROSEILLER ÉPINEUX.
Grossularia simplici acino vel spinosa, sylvestris. T.

HEDERA. petala 5, oblonga. bacca 5-sperma, ca-
lyce ciuita.

134. *Helix*. Foliis ovatis lobatisque. LIERRE. Hedera
arborea. T.

VITIS. Petala apice cohærentia, emarcida. Bacca 5-
sperma, supera.

135. *Vinifera*. foliis lobatis sinuatissimis nudis. VIGNE. Vitis
vinifera. T.

136. *Labrusca*. foliis cordatis subtrilobis dentatis subtus
tomentosis.

toomentosis. *VIGNE SAUVAGE.* Vitis sylvestris labrusca. T.

ILLECEBRUM. cal. 5-phyllus, cartilagineus. cor. o. stigma simplex. caps. 5-valvis monoperma.

137. *Paronychia.* Floribus bracteis nitidis obvallatis, caulis procumbentibus, foliis laevibus. *HERBE AUX PANARIS.* Paronychia hispanica. T.

VINCA. contorta. folliculi 2 erecti. sem. nuda.

138. *Minor.* caulis procumbentibus, foliis lanceolato-ovatis, floribus pedunculatis. *PETITE PERVENCHE.* Pervinca vulgaris angustifolia. T.

139. *Major.* caulis erectis, foliis ovatis, floribus pedunculatis. *GRANDE PERVENCHE.* Pervinca vulgaris latifolia flore cœrulæo. T.

NERIUM. contorta, folliculi 2, erecti. sem. plumosa. cor. tubus terminatus corona lacera.

140. *Oleander.* foliis linearis lanceolatis ternis, corollis coronatis. *LAURIER ROSE.* Nerion floribus rubescitibus. T.

Digynia.

CYNANCHUM. contorta. Nectarium cylindricum; 5-dentatum.

141. *Monspelianum.* caule volubili herbaceo, foliis reniformi cordatis acutis. *SCAMONÉE DE MONTPELLIER.* Periploca Monspeliaca, foliis rotundioribus. T.

ASCLEPIAS. Contorta. Nec. 5, ovata concava, corniculum exerentia.

142. *Vincetoxicum.* foliis ovatis basi barbatis, caule erecto, umbellis proliferis. *DOMPTÉ VENIN.* Asclepias albo flore. T.

HERNIARIA. cal. 5-partitus. cor. o. stam. 5, sterilia. caps. 1-sperma.

143. *Glabra.* Glabra glomerulis multifloris. *TURQUETTE LISSE.* Herniaria glabra. T.

144. *Hirsuta.* Hirsuta, glomerulis paucifloris. *TUR-*

- QUETTE VELUE.* Heruiaria hirsuta. T.
CHENOPODIUM. *cal.* 5-phyllo, 5-gonum. *cor.* o.
sem. 1 lenticulare, superum.
145. *Bonus henricus.* foliis triangulari sagittatis integerimis, spicis compositis aphillis axillaribus. *BON HENRI.* Chenopodium folio triangulato. T.
146. *Botrys.* foliis oblongis squatuatis, racemis nudis multifidis. *BOTRIS.* Chenopod. ambrosioides folio squato. T.
147. *Ambrosioides.* foliis lanceolatis dentatis, racemis foliatis simplicibus. *THÉ DU MEXIQUE.* Chenop. ambrosioid. Mexicanum. T.
148. *Vulvaria.* foliis integerimis rhombeo ovatis, floribus conglomeratis axillaribus. *ARROCHE PUANTE.* Chenopodium foetidum. T.
- BETA.* *cal.* 5-phyllo. *cor.* o. *sem.* reniforme, intrà substantiam baseos calycis.
149. *Vulgaris.* Floribus congestis. *POIRÉE.* *BETTE.* Beta rubra vulgaris. T.
- SALSOLA.* *cal.* 5-phyllo. *cor.* o. *caps.* 1-sperma. *sem.* cochleatum.
150. *Kali.* herbacea decumbens, foliis subulatis spinosis, calycibus marginatis axillaribus. *KALI.* Kali spinosum foliis crassioribus & brevioribus. T.
151. *Soda.* herbacea patula, foliis inerimibus. *SOUDE.* Kali majus, cochleato scamine.
- ULMUS.* *cal.* 5-fidus. *cor.* o. Bacca exsucca, compresso membranacea.
152. *Campestris.* Foliis duplicito-serratis : basi inaequalibus. *ORMEAU.* *ORME.* Ulinus campestris & theophrasti: T.
- GENIÉANA.* *cor.* 1-petala. *caps.* 2-valvis, 1-locularis receptaculis 2 longitudinalibus.
153. *Lutea,* corollis sub quinque fidis rotatis verticillatis calycibus spathaceis. *GRANDE GENTIANE.* Gentiana major lutea. T.
154. *Centaurium.* corollis 5-fidis infundibuliform. caule dichotomo, pistillo simplici. *PETITE CENTAU-*

RÉE. Centaurium minus. *id.* flore albo. T.

155. *cruciata*. Corollis quadrifidis imberbibus, floribus verticillatis sessilibus. GENTIANE CROISSETTE. Gentiana cruciata. T.

Umbellatæ.

ERYNGIUM. Flores capitati. *receptaculo* paleaceo.

156. *Maritimum*. Foliis radicalibus subrotundis plicatis spinosis, capitulis pedunculatis paleis tricuspidatis. PANICAUT MARIN. Eryngium maritimum. T.

157. *Campestre*. Foliis radicalibus amplexicaulibus pin-nato lanceolatis. CHARDON ROLLAND ou A CENT TETES. PANICAUT. Eryngium vulgare. T.

- SANICULA. Umbellæ confertæ, subcapitatæ. *Fru*ctus scaber. Flores disci abortientes.

158. *Europæa*. Foliis radicalibus simplicibus, flosculis omnibus sessilibus. SANICLE. Sanicula officinaria. T.

- ASTRANTIA. involucra partialia lanceolata, paten-tia, æqualia, longiora, colorata. Flores plurimi abortientes.

159. *Major*. Foliis 5-lobis : lobis 3-fidis. SANICLE FEMELLE. Astrantia major coronâ floris purpurascente . . . candidâ. T.

- BUPLEVRUM. Involucra umbellulæ majora; 5-phyl-la. Petala involuta. *Fru*ctus subrotundus, compressus striatus.

160. *Rotundifolium*. involucris universalibus nullis, foliis perfoliatis. PERCE FEUILLE. Buplevrum perfoliatum rotundifolium annum. T.

- TORDYLIUM. cor. radiatæ, omnes hermaphroditæ. *Fru*ctus suborbicularis, margine cre-natus. Involucra, longa, indivisa.

161. *Officinale*: involucris partialibus longitudine flo-rum, foliolis ovatis laciniatis. SESELI DE CRETE. Tordylium Narbonense minus. T.

- DAUCUS.** *cor.* subradiatæ. *flosculi* disci abortivi. *Fructus* pilis hispidus.
162. *Carota.* Seminibus hispidis, petiolis subtus nervosis. **CAROTTE.** *Daucus vulgaris . . . sativus.* T.
163. *Vifnaga.* Seminibus lævibus, umbella universali basi coalita. **VISNAGUE.** *Fœniculum annuum umbella contractâ oblongâ.* T.
- AMMI.** involucra pinnatifida. *corollæ* radiatæ : omnes hermaphroditæ. *Fructus* lævis.
164. *Majus.* foliis inferioribus pinnatis lanceolatis serratis, superioribus multifidis linearibus. **AMMI.** *Ammi majus.* T.
- BUNIUM.** *cor.* uniformis. Umbella conferta. *Fructus* ovati.
165. *Bulbocastanum.* involucro polyphyllo. **TERRE NOIX.** *Bulbocastanum majus folio apii.* T.
- CONIUM.** involucella dimidiata, subtriphylla. *Fructus* subglobosus 5-striatus, utrinque crenatus.
166. *Maculatum.* seminibus striatis. **GRANDE CIGUE.** *Cicuta major.* T.
- ATHAMANTA.** *Fructus* ovato oblongus, striatus. *Petalæ* inflexa emarginata.
167. *Libanotis.* foliis bipinnatis planis, umbella hemisphærica, seminibus hirsutis. **ATHAMANTE DE MONTAGNE.** *Apium petræum montanum album* *Bauhin.* *hist.* *Libanotis apii folio minor.* *C. Bauh. pinax.*
168. *Cretensis.* foliolis linearibus planis hirsutis, petalis bipartitis, seminibus oblongis hirsutis. **ATHAMANTE DE CRETE.** *Myrrhis annua, semine striato, villoso, incana.* T.
- PEUCEDANUM.** *Fructus* ovatus, utrinque striatus, ala cinctus. *Involucra* brevissima.
169. *Officinale.* foliis quinques tripartitis filiformibus linearibus. **QUEUE DE POURCEAU.** *Peucedanum germanicum.* T.
170. *Silaus.* foliolis pinnatifidis : laciniis oppositis, involucro universali diphyllo. **SAXIFRAGE DES AN-**

GLOIS. Angelica pratensis apii folio. T.

CRITHMUM. *Fructus ovalis*, compressus. *Flosculi aequales.*

171. *Maritimum*. foliis lanceolatis carnosis. FENOUIL DE MER. Crithmum sive fœniculum maritimum minus. T.

FERULA. *Fructus ovalis*, compresso-planus, striis utrinque tribus.

172. *Communis*. foliolis linearibus longissimis. FERULE. Ferula fœmina plinii. T.

LASERPITIUM. *Fructus oblongus*: angulis membranaceis. pet. inflexa, emarginata, patentia.

173. *Gallicum*. L. T. foliis cuneiformibus furcatis. LASER.

174. *Siler*. foliolis ovali-lanceolatis, integerrinis petiolatis. SESELI DE MONTAGNE. Ligusticum quod se seli officinarum.: ligust. f. siler. montan. angustif. T.

HERACLEUM. *Fructus ellipticus*, emarginatus, compressus, striatus marginatus. Cor. difformis inflexo emarginata. *Involucrum caducum.*

175. *Sphondylium*. foliolis pinnatifidis lœvibus, floribus uniformibus. BERCE. FAUSSE BRANC-URSINE. Sphondylium vulgare, hirsutum. T.

LIGUSTICUM. *Fructus oblongus*, 5-sulcatus utrinque. Corollæ aequales. Petalis involutis integris.

176. *Levisticum*. Foliis multiplicibus: foliolis superne incisis. LEVECHE. ACHE DE MONTAGNE. Angelica montana, percunis, paludapii folio T.

ANGELICA. *Fructus subrotundus*, angulatus, solidus, stylis reflexis. Corollæ aequales: petalis incurvis.

177. *Archangelica*. foliorum impari lobato. ANGELIQUE. Imperatoria sativa. T.

178. *Sylvestris*. foliolis aequalibus, ovato-lanceolatis

- ferratis. ANGELIQUE DES PRÉS. Imperatoria pratensis major. T.
- SIUM. Fructus subovatus, striatus. *Involucrum polyphyllum. Petala cordata.*
179. *Angustifolium.* foliis pinnatis, umbellis axillariibus pedunculatis, involucro universali piunatifido. BERLE A FEUILLES ÉTROITES. Sium sive apium palustre foliis oblongis. T.
180. *Nodiflorum.* foliis pinnatis, umbellis axillaribus sessilibus. BERLE A FLEURS SESSILES. Sium aquaticum ad alas floridum. T.
181. *Sisarum.* foliis pinnatis : floralibus ternatis. CHERVI. Sisarum germanorum. T.
- SISON. Fructus ovatus, striatus. *involucra sub 4-phylla.*
182. *Amomum.* foliis pinnatis, umbellis erectis. AMOME. Sium aromaticum, sison officinarum. T.
183. *Ammi.* foliis tripinnatis : radicalibus linearibus ; caulinis setaceis : stipularibus longioribus. Gouan. SISON AROMATIQUE. Fœniculum annum origani odore. T.
- BUBON. Fructus ovatus, striatus, villosus.
184. *Macedonicum.* foliolis rhombeo-ovatis crenatis, umbellis numerosissimis. PERSIL DE MACEDOINE. Apium macedonicum. T.
185. *Galbanum.* foliolis rhombeis dentatis glabris striatis, paucis. GALBANUM. Fernla galbanifera. T.
- CUMINUM. Fructus ovatus, striatus. *Umbellulæ 4 : - involucra 4-sida.*
186. *Cyminum.* CUMIN. Fœniculum orientale, cuminum dictum. T.
- ŒNANTHE. *Flosculi* difformes : in disco sessiles, sterile. Fructus calyce & pistillo coronatus.
187. *Crocata.* foliis omnibus multifidis obtusis sub æquilibus. ŒNANTHE VIREUSE : Œnanthe chærophylli foliis. T.
188. *Pimpinelloides.* Foliolis radicalibus cuneatis fissis ; caulinis integris linearibus longissimis, simplicibus.

FILIPENDULE AQUATIQUE. *Œnanthe apii* folio.

T.

PHELLANDRIUM. *Flosculi* disci minores. *Fructus* ovatus, lœvis, coronatus périanthio & pistillo.

189. *Aquaticum*. foliorum ramificationibus divaricatis. CIGUE D'EAU. Phellandrium. T.

ÆTHUSA. *Involucella* dimidiata, 3-phylla, pendula. *Fructus* striatus.

190. *Cynapium*. foliis conformibus. PETITE CIGUE. Cicuta minor petroselino similis. T.

191. *Meum*. foliis omnibus multipartito setaceis. MEUM. Meum foliis anethi. T.

CORIANDRUM. cor. radiata. pet. inflexo-emarginata. *Involucrum* universale 1-phylum : partialia dimidiata. *fructus* sphericus.

192. *Sativum*. fructibus globosis. CORIANDRE. Coriandum majus. T.

SCANDIX. cor. radiata. *fructus* subulatus. *petala* emarginata. *Flosculi* disci sœpius masculi.

193. *Odorata*. seminibus sulcatis odoratis. CERFEUIL MUSQUÉ. Myrrhis major, vel cicutaria odorata. T.

194. *Cerefolium*. seminibus nitidis ovato-subulatis umbellis sessilibus lateralibus. CERFEUIL. Chærophillum sativum. T.

CHÆROPHYLLUM. *Involucrum* reflexum concavum. *petala* inflexo-cordata, *fructus* oblongus lœvis.

195. *Sylvestre*. caule striato geniculis tumidisculis. CERFEUIL SAUVAGE. Chæroph. sylvestre perenne cicutæ folio. T.

196. *Temulum*. caule scabro : geniculis tumidis. CERFEUIL TACHETTÉ. Myrrhis annua, semine striato, lœvi. T.

IMPERATORIA. *Fructus* subrotundus, compressus, medio gibbus, margine cinctus. *petala* inflexo-emarginata.

197. *Ostruthium*. IMPERATOIRE. BENJOIN FRANÇAIS. Imperatoria major. T.

- SESELI. *Umbellæ globosæ. involucr. folio uno altero-ve. Fructus ovatus, striatus.*
198. *Tortuosum. caule alto rigido, foliolis linearibus fasciculatis.* SESELI DE MARSEILLE. Fœniculum tortuosum. T.
- THAPSIA. *Fructus oblongus, membrana cinctus.*
199. *Villosa. foliolis dentatis villosis basi coadunatis.* THAPSIE. MALHÉRBE. TURBITH. Thapsia latifolia villosa. T.
- PASTINACA. *Fructus ellipticus, compresso-planus. petala involuta, integra.*
200. *Sativa. foliis simpliciter pinnatis.* PANNAIS CULTIVÉ. Pastinaca sylvestris. . . . Sativa latifolia. T.
201. *Opopanax. foliis pinnatis: foliolis basi antica excisis.* PANNAIS ÉLEVÉ. Pastinaca sylvestris altissima. T.
- SMYRNIUM. *Fructus oblongus, striatus. petala acuminata, carinata.*
202. *Olusatrum. foliis caulinis ternatis petiolatis serratis.* MACERON. Smyrnium mathioli. T.
- ANETHUM. *Fructus subovatus, compressus, striatus. petala involuta, integra.*
203. *Graveolens. fructibus compressis.* ANET. Anethum hortense. T.
204. *Fœniculum. fructibus ovatis.* FENOUIL. Fœniculum vulgare germanicum. Fœnic. dulce. T.
- CARUM. *Fructus ovato-oblongus, striatus. involucrum 1-phylum. petala carinata, inflexo-emarginata.*
205. *Carvi. L. T. CARVI.*
- PIMPINELLA. *Fructus ovato-oblongus. petala inflexa. stigma subglobosa.*
206. *Saxifraga. foliis pinnatis: foliolis radicalibus subrotundis; summis linearibus.* PETIT BOUCAGE. Tragoselinum alterum majus . . . minus. T.
207. *Anisum. foliis radicalibus trifidis incisis.* ANIS. Apium anisum dictum semine suaveolente majori . . . minori. T.

APIUM.

- APIUM. *Fructus ovatus, striatus. involucrum 1-phyl-*
lum. petala æqualia.
208. *Petroselinum. Foliolis caulinis linearibus, involu-*
cellis minutis. PERSIL. Apium hortense seu petro-
selinum vulgo. T.
209. *Graveolens. Foliis caulinis cuneiformibus. CELERI.*
Apium palustre & apium officinarum .. apium
dulce, celeri italorum. T.
- ÆGOPODIUM. *Fructus ovato-oblongus, striatus.*
210. *Podagraria. foliis caulinis summis ternatis. HERBE*
À GERARD. Angelica sylvestris minor sive erratica. T.

Trigynia.

- RHUS. *cal. 5-partitus. petala 5. bacca 1-sperma.*
211. *Coriaria. foliis pinnatis obtusifuscule serratis ovali-*
bus subtus villosis. SUMAC. Rhus folio ulmi. T.
212. *Toxicodendron. foliis ternatis : foliolis petiolatis*
angulatis pubescentibus, caule radicante. LIER-
RE VENENEUX DU CANADA. Toxicodendron tri-
phyllon folio sinuato pubescente. T.
- VIBURNUM. *cal. 5-partitus superus. cor. 5-fida. bacca*
1-sperma.
213. *Lantana. foliis cordatis serratis venosis, subtus to-*
mentosis. VIORNE. Viburnum vulgo. T.
214. *Opulus. foliis lobatis, petiolis glandulosis. OBIER.*
ROSE DE GUELDRÉ. BOULE DE NEIGE. Opulus,
T.
- SAMBUCUS. *cal. 5-partitus. cor. 5-fida. bacca 3-sperma.*
215. *Ebulus. cymis tripartitis, stipulis foliaceis, caule*
herbaceo. YEBLE. Samb. humilis. f. ebulus. T.
216. *Nigra. cymis 5-partitis, caule arboreo. SUREAU.*
Sambucus fructu in nimbellâ nigro. T.
217. *Racemosa. Racemis compositis, ovatis, caule ar-*
boreo. SUREAU À GRAPPES. Samb. racemosa ru-
bra. T.
- TAMARIX. *cal. 5-partitus. pet. 5. caps. 1-locularis,*
3-valvis. sem. papposa.

26 PENTANDRIA TRIGYNIA.

218. *Gallica*. floribus pentandris. TAMARIS. Tamariscus Narbonensis. T.

ALSINE. cal. 5-phyllo. petala 5 æqualia. caps. 1-locularis, 3-valvis.

219. *Media*. Petalis bipartitis, foliis ovato-cordatis. MORGELINE. L. T.

Pentagynia.

STATICE. cal. 1-phyllo, integer, plicatus, scariosus. petala 5 sem. 1. superum.

220. *Limonium*. scapo paniculato tereti, foliis lævibus enerviis, subtus mucronatis. BEHEN ROUGE. Limonium maritimum majus. T.

LINUM. cal. 5-phyllo. petala 5-caps. 5-valvis, 10-locularis. sem. solitaria.

221. *Ustatissimum*. calycibus capsulisque mucronatis, petalis crenatis, foliis lanceolatis alternis, caule subsolitario. LIN. Linum arvense ... sativum. T.

222. *Catharticum*. foliis oppositis, oyato-lanceolatis, caule dichotomo, corollis acutis. LIN PURGATIF. Linum pratense flosculis exiguis. T.

DROSERA. cal. 5-fidus. pet. 5. caps. 1-locularis : apice 5-valvis. sem. plurima.

223. *Rotundifolia*. Scapis radicatis, foliis orbiculatis. ROSSOLI A FEUILLES RONDES. Rossolis folio rotundo. T.

CLASSIS VI^a. HEXANDRIA.

Monogynia.

NARCISSUS. petala 6 æqualia : nectario infundibuliformi 1-phyllo. stam. intrà nectarium.

224. *Pseudo-Narcissus*. Spatha uniflora, nectario cam-

panulato erecto crispo, æquante petala ovata.
NARCISSE SAUVAGE. *Narciss. sylvestris*, pallidus,
calyce luteo. T.

PANCRATIUM. Petala 6: nectario 12-fido. *flam.* nec-
tario imposita.

225. *Maritimum*. Spatha multiflora, petalis planis, fo-
liis lingulatis. NARCISSE DE MER. *Narcissus mari-
timus*. T.

ALLIUM. cor. 6 partita, patens. Spatha multiflora.
Umbella congesta. *caps.* supera.

226. *Porrum*. caule planifolio umbellifero, staminibus
tricuspidatis, radice tunicata. PORREAU. *Porrum
commune capitatum* .. p. *sativum latifol.* T.

227. *Victorialis*. caule planifolio umbellifero, umbella
rotundata, staminibus lanceolatis corolla longio-
ribus, foliis ellipticis. AIL TACHETÉ DES MON-
TAGNES. *Allium montanum latifolium macula-
tum*. T.

228. *Sativum*. caule planifolio bulbifero, bulbo com-
posito, staminibus tricuspidatis. AIL L. T.

229. *Scorodoprasum*. caule planifolio bulbifero, foliis
crenulatis: vaginis ancipitibus, staminibus tricus-
pidatis. ROCAMBOLE. *Allium sativum*, alterum,
five allioprasum caulis summo circumvoluto. T.

230. *Aascalonicum*. scapo nudo tereti, foliis subulatis,
umbella globosa, staminibus tricuspidatis. ECHA-
LOTE. *Cepa ascalonica*. T.

231. *Cepa*. Scapo nudo inferne ventricoso longiore foliis
teretibus. OIGNON. *Cepa vulgaris*. T.

232. *Fistulosum*. Scapo nudo adæquante folia teretia
ventricosa. CIBOULE. *Cepa oblonga*. T.

LILIUM. cor. 6-petala, campanulata: linea longitu-
dinali nectarifera. *caps.* valvulis pilo cancel-
lato connexis.

233. *Candidum*. foliis sparsis, corollis campanulatis;
intus glabris. LYS. *Lilium album vulgare*. T.

234. *Martagon*. foliis verticillatis, floribus reflexis,
corollis revolutis. LYS MARTAGON. *Lilium floribus*

reflexis, montanum, flore rubente. & 6. seq. T.

FRITILLARIA. cor. 6-petala, campanulata, supra unguis cavitate nectarifera. flam. longitudine corollæ.

235. *Imperialis.* Racemo comoso inferne nudo, foliis integerimis. COURONNE IMPÉRIALE. Corona imperialis. T.

TULIPA. cor. 6-petala, campanulata. stylus nullus.

236. *Gesneriana.* flore erecto, foliis ovato-lanceolatis.

TULIPE DES JARDINIERS. Tulipa & variet. T.

SCILLA. cor. 6-petala, patens, decidua. Filamenta filiformia.

237. *Maritima.* nudiflora, bracteis refractis SCILLE. Ornithogalum maritim. seu scilla radice rubrâ . . radice albâ. T.

ASPHODELUS. cor. 6-partita. Nectarium ex valvulis sex germinis tegentibus.

238. *Ramosus.* caule nudo, foliis ensiformibus carinatis lœvibus. ASPHODELE RAMEUX. Asphodelus albus ramosus, mas albus non ramosus. T.

ASPARAGUS. cor. 6-partita, erecta : petalis tribus interioribus apice reflexis. bacca 3-locularis, 2-sperma.

239. *Officinalis.* caule herbaceo tereti erecto, foliis se-taceis, stipulis paribus. ASPERGE. Asparagus sativa. A. sylvestris tenuissimo folio. A. maritimus crassiore folio. T.

240. *Acutifolius.* caule inermi angulato fruticoso, foliis aciformibus rigidulis perennantibus mucronatis æqualibus. ASPERGE PIQUANTE. Asp. foliis acutis. T.

CONVALLARIA. cor. 6-fida. bacca maculosa, 3-locularis.

241. *Maialis.* scapo nudo. MUGUET DES VALLÉES. Lilium convallium album . . latifolium. T.

242. *Polygonatum.* foliis alternis amplexicaulibus, caule ancipiti, pedunculis axillaribus subuniifloris. SEAU DE SALOMON. Polygonatum latifol. vulgare.

p. latifolium , flore majore , odoro. p. lat. minus
flore majore. T.

HYACINTHUS. cor. campanulata : pori 3 melliferi
gerininiis.

243. *Muscari*. corollis ovatis omnibus æqualibus. HYA-
CINTHE MUSQUÉ *Muscari moschatum griseo ob-*
soleto flore. m. obsoletiore flore. T.

ALOE. cor. erecta , ore patulo , fundo nectarifero. Fi-
lamenta receptaculo inserta.

244. *Perfoliata*. Floribus corymbosis cernuis subcylin-
dricis. Vera. decima sexta & ultima varietas foliis
spinosis confertis dentatis vaginantibus planis ma-
gnatis. ALOÉS SUCCOTRIN. Aloë vulgaris. T.

HEMEROCALLIS. cor. campanulata : tubo cylindrico
stamina declinata.

245. *Flava*. corollis flavis. LYS ASPHODELE JAUNE.
Lilio asphodelus luteus . . . luteus minor. T.

246. *Fulva*. corollis fulvis. LYS ASPHODELE ROUGE.
Lilio asphodelus phœniceus. T.

ACORUS. Spadix cylindricus , tectus flosculis. cor. 6-
petalæ , undæ , stylus o. caps. 3-locularis.

247. *Calamus*. JONC ODORANT. Acorns verus s. calamus
aromaticus officinarum. Bauhin pinax.

JUNCUS. cal. 6-phyllus. cor. o. caps. 1-locularis.

248. *Acutus*. culmo subnudo tereti mucronato , pani-
cula terminali , involucro diphylo spinoso. JONC.
Juncus acutus capitulis forghi. T.

BERBERIS. cal. 6-phyllus. pet. 6 : ad ungues glandu-
lis 2. Stylis o. Bacca 2-sperma.

249. *Vulgaris*. pedunculis racemosis. ÉPINE VINETTE.
Berberis dumetorum. T.

Digynia.

ORYZA. cal. gluma 2-valvis , 1-flora. cor. 2-valvis ,
subæqualis , semini adnascens.

250. *Satiya*. L. T. Ris.

Trigynia.

RUMEX. *cal.* 3-phyllos: *petala* 3 conniventia. *sem.* 1 triquetrum.

251. *Patientia.* floribus hermaphroditis : valvulis integrerimis ; unica granifera : foliis ovato-lanceolatis. PATIENCE. RHUBARBE DES MOINES. Lapatnum hortense , folio oblongo , sive secundum dioscoridis. l. hort. latifolium. T.
252. *Sanguineus.* floribus hermaphroditis : valvulis integrerimis : unica granifera , foliis cordato-lanceolatis. SANG DRAGON. PATIENCE ROUGE. Lapatnum folio acuto rubente. T.
253. *Acutus.* floribus hermaphroditis : valvulis dentatis graniferis , foliis cordato-oblongis acuminatis. PATIENCE SAUVAGE. Lapatnum folio acuto , plano. T.
254. *Aquaticus.* floribus hermaphroditis : valvulis integrerimis nudis. Foliis cordatis glabris acutis. PARRELLE. PATIENCE DES MARAIS. Lapatnum aquaticum folio cubitali. T.
255. *Scutatus.* floribus hermaphroditis , foliis cordato-hastatis caule tereti. OZEILLE OREILLÉE. Acetosa scutata repens. a. rotundifolia hortensis. T.
256. *Acetosa.* floribus dioicis , foliis oblongis sagittatis. OZEILLE. Acetosa pratensis. a. p. flore albo. a. montana maxima. T.
257. *Acetosella.* floribus dioicis , foliis lanceolato-hastatis. OZEILLE LANCEOCÉE. Acetosa arvensis lanceolata. a. lanceolata angustifolia repens. a. arv. minima non lanceolata. T.
- COLCHICUM.** *Spatha. cor.* 6-partita : tubo radicato. *capsulæ* 3. connexæ , inflatæ.
258. *Autumnale.* foliis planis lanceolatis erectis. COLCHIQUE. TUE CHIEN. Colchic. commune. T.

Polygynia.

ALISMA. cal. 3-phillus. petala 3. semina plura.

259. *Plantago. soliis ovatis acutis, fructibus obtuse trigonis.* PLANTAIN D'EAU. *Ranunculus palustris plantaginis folio ampliore.* T.

260. *Damasonium. foliis cordato-oblongis, floribus hexaginis, capsulis subulatis.* FLUTEAU ÉTOILÉ.

CLASSIS VII^a. HEPTANDRIA.*Monogynia.*

ÆSCULUS. *cal. 1-phillus, 5-dentatus, ventricosus. cor. 5-petala, inæqualiter colorata, calyci inserta. caps. 3-locularis.*

261. *Hippocastanum. floribus heptandris.* MARRONNIER D'INDE. *hippo-castanum vulgare.* T.

CLASSIS VIII^a. OCTANDRIA.*Monogynia.*

TROPÆOLUM. *cal. 1-phillus, calcaratus. petala 5, inæqualia. Baccæ 3, siccæ.*

262. *Majus. foliis peltatis sub quinque-lobis, petalis obtusis.* CAPUCINE. *Cardamindum ampliori folio & majori flore.* T.

EPILOBIUM. *cal. 4 fidus, petala 4. caps. oblonga infera. semina papposa.*

263. *Angustifolium. foliis sparsis linearis lanceolatis, floribus inæqualibus.* HERBE DE-ST. ANTOINE NERIETTE A ÉPI. *Chamænerion latifolium, vul-*

gare. ch. lat. vul. flore albo .. ch. lat. alpinum ..
ch. angustifol. alpin. fl. purpureo ... flore albo ..
flore variegato. T.

VACCINIUM. *cal.* superus. *cor.* 1-petala. *filamenta* re-
ceptaculo inserta. *Bacca* 4-locularis ,
polysperma.

264. *Myrtillus*. pedunculis unifloris , foliis serratis ova-
tis deciduis , caule angulato. AIRELLE. MIRTIL-
LE. Vitis idæa foliis oblongis , crenatis , fructu
nigricante.

ERICA. *cal.* 4-phyllo. *cor.* 4-fida. *filam.* receptaculo
inserta. *antheræ* bifidæ. *caps.* 4-locularis.

265. *Vulgaris*. antheris aristatis , corollis campanula-
tis subæqualibus , calycibus duplicatis , foliis op-
positis sagittatis. BRUYERE. Erica vulgaris glabra ..
flore albo. e. myricæ folio , hirsuta. T.

DAPHNE. *cal.* o. *cor.* 4-fida , corollacea , marcescens ,
stamina includens. *bacca* 1-sperma.

266. *Mezereum*. floribus sessilibus ternis caulinis , foliis
lanceolatis deciduis. Bois GENTIL. LAUREOLE
FEMELLE. Thymelæa laurifolio deciduo , sive
laureola fœmina ... flore albido , fructu flaves-
cente. T.

267. *Laureola*. racemis axillaribus quinque floris , foliis
lanceolatis glabris. LAUREOLE MALE. Thymelæa
laurifolio , semper virens , seu laurea mas. T.

268. *Gnidium*. panicula terminali , foliis linear-lanceo-
latis , acuminatis. GAROU. Thymelæa foliis lini. T.

Trigynia.

POLYGONUM. *cal.* o. *cor.* 5-partita , calycina. *sem.*
I , angulatum.

269. *Bistorta*. caule simplicissimo monostachyo , foliis
ovatis in petiolum decurrentibus. BISTORTE. Bis-
torta major , radice magis intortâ. T.

270. *Hydropiper*. floribus hexandris semi digynis , foliis
lanceolatis , stipulis subinuticis. CURAGE. PERSI-
CAIRE

CAIRE ACRE. POIVRE D'EAU. *Perficaria urens*
five *hydropiper*. T.

271. *Perficaria*. Floribus hexandris digynis, spicis ovato-oblongis, foliis lanceolatis, stipulis ciliatis. PERSICAIRE. *Perficaria mitis maculosa* ... non maculosa. p. minor. p. angustifolia. T.
272. *Aviculare*. Floribus octandris trigynis axillaribus; foliis lanceolatis, caule procumbente herbaceo. RENOUÉE. TRAINASSE. *Polygonum latifolium*. p. latif. fl. candido. p. oblongo (vel brevi) angusto que folio. T.
273. *Fagopyrum*. foliis cordato-sagittatis, caule erectiusculo inermi, seminum angulis æqualibus. BLED NOIR ou SARRASIN. *Fagopyrum vulgare erectum*. T.

Tetragynia.

- PARIS. cal. 4-phyllus. pet. 4, angustiora. *bacca* 4-locularis.
274. *Quadrifolia*. foliis quaternis. RAISIN DE RENARD, Herba paris. T.
-

CLASSIS IX^a. ENNEANDRIA.

Monogynia.

- LAURUS. cal. o. cor. calycina, 6-partita. Necratium glandulis tribus, bisetis, germen cingentibus. Filamenta interiora glandulifera. Drupa 1-sperma.
275. *Nobilis*. foliis lanceolatis venosis perennantibus, floribus quadrifidis dioicis. LAURIER. *Laurus vulgaris*. T.

Trigynia.

- RHEUM. *cal. o. cor. 6-sida*, persistens. *sem. 1*, triquetrum.
276. *Rhaponticum*. foliis glabris, petiolis subsulcatis.
RAPONTIC. Rhabarbarum forte dioscoridis & antiquorum. T.
277. *Rhabarbarum*. foliis subvillosis, petiolis æqualibus.
RHUBARBE.
278. *Palmatum*. foliis palmatis acuminatis. RHUBARBE
DE TARTARIE.
-

CLASSIS X^a. DECANDRIA.*Monogynia.*

- CASSIA. *cal. 5-phyllo*. *pet. 3*. *antheræ supernæ 5 steriles*: *infimæ 3 rostratæ*. Legumen.
279. *Senna*. foliis sexjugis subovatis, petiolis eglandulatis. SENNÉ. Senna alexandrina, sive foliis acutis.
S. italica f. foliis obtusis. T.
- DICTAMNUS. *cal. 5-phyllo*. *pet. 5*, patula. *filam. punctis glandulosis adspersa*. *caps. 5*. coalitæ.
280. *Albus*. DICTAME BLANC. FRAXINELLE. Fraxinella. T.
- RUTA. *cal. 5-partitus*. petala concava. *receptac. punctis melliferis decem cinctum*. *caps. lobata*.
281. *Graveolens*. foliis decompositis, floribus lateraliibus quadrifidis. RUE. Ruta hortensis latifolia. sylvestris major . . . minor. T.
- MELIA. *cal. 5-dentatus*. *pet. 5*. *nectarium cylindricum*, ore antheras gerens corollæ. Drupa nucleo 5-loculari.
282. *Azedarach*. foliis bipinnatis. FAUX SYCOMORE. Azedarach . . a. semper virens & florens. T.

- TRIBULUS. *cal.* 5-partitus. *petala* 5, patentia. *stylus* o. *caps.* 5, gibbæ, spinosæ polyspermæ.
 283. *Terrestris.* foliolis sex jugatis subæqualibus, semi-nibus quadricornibus. CROIX DE CHEVALIER. tribulus terrestris, ciceris folio, seminum integrum aculeato. T.
- ARBUTUS. *cal.* 5-partitus. *cor.* ovata: ore basi pellucida. bacca 5-locularis.
284. *Unedo.* caule arboreo, foliis glabris serratis, bacis polyspermis. ARBOUSIER. Arbutus folio serrato. T.
285. *Uva ursi.* caulibus procumbentibus, foliis integrumis. BOUSSEROLE. Uva ursi. T.
- PYROLA. *cal.* 5-partitus. *pet.* 5. *caps:* 5-locularis, angularis dehiscentia.
286. *Rotundifolia.* staminibus adscendentibus, pistillo declinato. PYROLE. Pyrola rotundifol. major. T.

Digynia.

- AXIFRAGA. *cal.* 5-partitus. *cor.* 5-petala. *caps.* 2-rostris, 1-locularis, polysperma.
287. *Rotundifolia.* foliis caulinis reniformibus dentatis petiolatis, caule paniculato. GEUM. SANICLE DE MONTAGNE. Geum rotundifolium majus. T.
288. *Granulata.* foliis caulinis reniformibus lobatis, caule ramoso, radice granulata. SAXIFRAGE GRANULÉE. Saxifraga rotundifolia alba. T.
- APONARIA. *cal.* 1-phyllo, nudus. *petala* 5, unguiculata. *caps.* oblonga, 1-locularis.
289. *Officinalis.* Calycibus cylindricis, foliis ovato-lanceolatis. SAPONAIRE. Lychnis sylvestris, quæ saponaria vulgo. T.
- IANTHUS. *cal.* cylindricus, 1-phyllo: basi squamis 4. *pet.* 5, unguiculata. *caps.* cylindrica 1-locularis.
290. *Caryophyllus.* floribus solitariis: squamis calycinis subovatis brevissimis, corollis crenatis. OËILLETT

DES JARDINS. *Caryophyllum hortensis simplex flore majore .. & variet. T.*

Trigynia.

CUCUBALUS. *cal.* inflatus. petala 5, unguiculata, absque corona ad faucem. *caps.* 3-lo-
cularis.

291. **Behen.** calycibus subglobosis glabris reticulato-venosis, capsulis trilocularibus, corollis subnudis. BEHEN BLANC. *Lychnis sylvestris quæ behen album vulgo.* T.

Pentagynia.

COTYLEDON. *cal.* 5-fidus. *cor.* 1-petala. *squamæ nectariferæ* 5, ad basin germinis. *caps.* 5.

292. **Umbilicus.** foliis cucullato-peltatis ferrato-dentatis alternis, caule ramoso, floribus rectis. NOMBREL DE VENUS. *Cotyledon major.* T.

SEDUM. *cal.* 5-fidus. *cor.* 5-petala. *squamæ nectariferæ* 5, ad basin germinis. *caps.* 5.

293. **Telephium.** foliis planiusculis ferratis, corymbo folioso, caule erecto. ORPIN. REPRISE. Anacampseros vulgo faba crassa .. a. purpurea. a. min. purpurea. a. maxima. T.

294. **Rupestre.** foliis subulatis quinquefariam consertis basi solutis, floribus cymosis. SEDON DES ROCHERS. *Sedum minus, luteum, folio acuto.* T.

295. **Album.** foliis oblongis obtusis teretiusculis sessilibus patentibus, cyma ramosa. SEDON BLANC TRIQUE MADAME. *Sedum minus teretifolium album ... alterum.* T.

296. **Acre.** foliis subovatis adnato-sessilibus gibbis erectiusculis alternis, cyma trifida. VERMICULAIRE BRULANTE. *Sedum parvum acre flore luteo.* T.

OXALIS. *cal.* 5-phyllo. *petala* unguibus connexa. *caps.* angulis dehiscens, 5-gona.

297. *Corniculata*. pedunculis umbelliferis, caule ramoso diffuso. ALLELUYA. PAIN A COUCOU. Oxys latea. T.

AGROSTEMMA. *cal.* 1-phyllo, coriaceus. *petala* 5, unguiculata: limbo obtuso, indiviso. *caps.* 1-locularis.

298. *Coronaria*. tomentosa, foliis ovato-lanceolatis, petalis emarginatis coronatis ferratis. COQUELOURDE. Lychnis coronaria sativa. & variet. T.

Decagynia.

PHYTOLACCA. *cal.* o. *petala*. 5, calycina. *bacca* supera 10-locularis, 10-sperma.

299. *Decandra*. floribus decandris. RAISIN D'AMERIQUE. Phytolacca americana, majori fructu. T.

CLASSIS XI^a. DODECANDRIA.

Monogynia.

A SARUM. *cal.* 3. f. 4-fidus, germini insidens. *cor.* o. *caps.* coriacea, coronata.

300. *Europaeum*. foliis reniformibus obtusis binis. CABARET. OREILLE D'HOMME. Asarum. T.

PORTULACA. *cor.* 5-petala. *cal.* 5-fidus. *caps.* 1-locularis circumscissa, aut 3-valvis.

301. *Oleracea*. foliis cuneiformibus, floribus sessilibus. POURPIER. Portulaca latifolia sive sativa. p. angustifolia s. sylvestris. T.

LYTHRUM. *cal.* 12-phyllo. *petala* 6, calyci inserta. *caps.* 2-locularis, polysperma.

302. *Salicaria*. foliis oppositis cordato-lanceolatis, floribus spicatis dodecandris, SALICAIRE. Salicaria

38 DODECANDRIA MONOGYNIA.

vulgaris purpurea foliis oblongis. T.

AGRIMONIA. cal. 5-dentatus , altero obvallatus. pet. 5. sem. 2 , in fundo calycis.

303. *Eupatoria*. foliis caulinis pinnatis: impari petiolato , fructibus hispidis. AIGREMOINE. Agrimonia officinarum. T.

RESEDA. cal. 1-phyllo , partitus. petala laciniata. caps. ore dehiscens , 1-locularis.

304. *Luteola*. foliis lanceolatis integris basi utrinque unidentatis. Calycibus quadrifidis. GAUDE. Luteola herba salicis folio. T.

305. *Lutea*. foliis omnibus trifidis : inferioribus pinnatis. HERBE MAURE. Reseda vulgaris. r. crispa gallica. T.

306. *Phyteuma*. foliis integris trilobisque , calycibus sexpartitis maximis. RESEDA DES CHAMPS. R. minor vulgaris. R. m. v. folio minus inciso. R. m. v. fol. integris. T.

EUPHORBIA. cor. 4. f. 5-petala , calyci insidens. cal. 1-phyllo , ventricosus , caps. 3-cocca.

307. *Officinarum*. aculeata nuda multangularis : aculeis geminatis. EUPHORBE.

308. *Lathyris*. umbella quadrifida : dichotoma , foliis oppositis integerrimis. EPURGE. Tithymalus latifolius catapucia dictus. T.

309. *Esula*. umbella multifida : bifida , involucellis subcordatis , petalis subbicornibus , ramis sterilibus , foliis uniformibus. ESULE. Tithymalus foliis pini , forte dioscoridis pithyusa. T.

310. *Characias*. umbella multifida : bifida , involucellis perfoliatis emarginatis ; foliis lanceolatis integerrimis , caule frutescente. TITHYMALE ROUGE. T. characias rubens peregrinus. T.

Dodecagynia.

SEMPERVIVUM. *cal.* 12-partitus. *petala* 12. *caps.* 12.
polyspermæ.

311. *Tectorum.* foliis ciliatis, propaginibus patentibus.
JOUBARBE. *Sempervivum majus vulgare.* T.

CLASSIS XII^a. ICOSANDRIA.*Monogynia.*

CACTUS. *cal.* 1-phyllus, superus, imbricatus:
cor. multiplex. *bacca* 1-locularis, poly-
sperma.

312. *Opuntia.* articulato - prolifer laxus, articulis ova-
tis, spinis setaceis. FIGUIER D'INDE. *Opuntia*
vulgò herbariorum. T.

313. *Cochenillifer.* Articulato-prolifer, articulis ovato-
oblongis subinermibus. RAQUETTE DE LA CO-
CHENILLE.

MYRTUS. *cal.* 5-fidus, superus. *petala* 5. *bacca* 2-f.
3-sperma.

314. *Communis.* floribus solitariis : involucro diphyllo.
MYRTHE. *Myrtus latifolia romana.* aliæq. species.
T.

PUNICA. *cal.* 5-fidus superus. *petala* 5. pomum multi-
loculare polyspermum.

315. *Granatum.* foliis lanceolatis, caule arboreo. GRE-
NADIER. *Punicæ* 9 species. T.

AMYGDALUS. *cal.* 3-fidus, inferus. *petala* 5. drupa
nuce poris perforata.

316. *Perfica.* foliorum ferraturis omnibus acutis, flori-
nus sessilibus solitariis. PECHER. *Perfica molli car-*
ne & vulgaris viridis & alba & variet. T.

317. *Communis.* foliorum ferraturis infimis glandulosis,

floribus sessilibus geminis. AMANDIER. Amygdalus sativa . . dulcis . . amara. T.

PRUNUS. cal. 5-fidus, inferus. petala 5. drupæ nux inturis prominulis.

318. *Laurocerasus*. floribus racemosis, foliis sempervirentibus dorso biglandulosis. LAURIER CERISE. Laurocerasus. T.

319. *Mahaleb*. floribus corymbosis terminalibus, foliis ovatis. PRUNIER ODORANT. BOIS DE STE. LUCIE. Cerasus sylvestris amara mahaleb putata. T.

320. *Armeniaca*. floribus sessilibus, foliis subcordatis. ABRICOTIER. Armeniaca fructu majori, nucleo amaro nucleo dulci. Arm. mala, minor. T.

321. *Cerasus*. umbellis subpedunculatis, foliis ovato-lanceolatis glabris conduplicatis. CERISIER. Cerasus sativa, fructu rotundo, rubro & acido, &c. T.

322. *Domestica*. pedunculis subsolitariis, foliis lanceolato-ovatis convolutis, ramis muticis. PRUNIER. Prunus, &c. T.

323. *Spinosa*. pedunculis solitariis, foliis lanceolatis glabris, ramis spinosis. PRUNIER ÉPINEUX. PRUNELLIER. Prunus sylvestris. T.

Digynia.

CRATÆGUS. cal. 5-fidus. petala 5. bacca infera difperma.

324. *Oxyacantha*. foliis obtusis subtrifidis serratis. AUBEPINE. Mespillus, apii folio, sylvestris spinosa sive oxyacantha. T.

325. *Azarolus*. foliis obtusis subtrifidis subdentatis. AZEROLIER. Mespillus apii folio laciniato. T.

Trigynia.

SORBUS. cal. 5-fidus. petala 5. bacca infera, 3-sperma.

326. *Aucuparia*. foliis pinnatis utrinque glabris. SORBIER DES OISELEURS. f. Aucuparia. T.

327. *Domestica*. foliis pinnatis subtus villosis. SORBIER.
Sorbus sativa. T.

Pentagynia.

- MESPILLUS. *cal.* 5-fidus. *pet.* 5. *bacca infera*, 5-
sperma.

328. *Germanica*. inermis, foliis lanceolatis, subtus to-
 mentosis, floribus sessilibus solitariis. NEFLIER.
 Mesp. german. folio laurino non serrato. T.

- PYRUS. *cal.* 5-fidus. *petala* 5. *pomum inferum*. 5-lo-
 culare, polyspermum.

329. *Communis*. foliis serratis lœvibus, floribus corym-
 bosis. POIRIER. *Pyrus sativa* . . . *sylvestris*. T.

330. *Malus*. foliis serratis, umbellis, sessilibus. POM-
 MIER. *Malus pumila* . . . *sylvestris* . . *sativa*, &c:
 T.

331. *Cydonia*. foliis integerrimis, floribus solitariis.
 COIGNASSIER. *Cydonia*, &c.

- SPIRÆA. *cal.* 5-fidus. *petala* 5. *caps.* polyspermæ.

332. *Filipendula*. foliis pinnatis. foliolis uniformibus.
 serratis, canle herbaceo, floribus corymbosis.
 FILIPENDULE. *Filipendula vulgaris*. T.

333. *Ulmaria*. foliis pinnatis: impari majore lobato flo-
 ribus cymosis. REINE DES PRÉS. *Ulmaria*. T.

Polygynia.

- ROSA. *petala* 5. *cal.* urceolatus, 5-fidus, carnosus;
 collo coarctatus. *sem.* plurima, hispida, ca-
 lycis interiori lateri affixa.

334. *Eglanteria*. Germinibus globosis pedunculisque
 glabris, caule aculeis sparsis rectis, petiolis sca-
 bris, foliolis acutis. ROSIER EGLANTIER. *Rosa*
sylvestris foliis odoratis . . r. *lutea simplex* . . .
 multiplex. T.

335. *Sempervirens*. Germinibus globosis pedunculisque
 hispidis., caule petiolisque aculeatis, floribus

42 ICOSANDRIA POLYGYNIA.

subumbellatis. ROSE MUSQUÉE. *r. moschata sem-pervirens*. T.

336. *Centifolia*. Germinibus ovatis pedunculisque hispidis, caule hispido aculeato, petiolis inerimibus. ROSE ROUGE. *Rosa multiplex media*. T.

337. *Canina*. Germinibus ovatis pedunculisque aculeatis. EGLANTIER. GRATTE-CUL. KYNORRHODON. *Rosa sylvestris vulgaris*, flore odorato, incarnato. T.

338. *Alba*. Germinibus ovatis glabris, pedunculis hispidis, caule petiolisque aculeatis. ROSIER BLANC. *Rosa alba vulgaris major*. T.

RÚBUS. cal. 5-fidus. petala 5. bacca composita acinis monospermis.

339. *Idæus*. foliis quinato-pinnatis ternatisque, caule aculeato, petiolis canaliculatis. FRAMBOISIER. *Rubus idæus spinosus. (lævis.) (fructu albo.)* T.

340. *Fruticosus*. foliis quinato digitatis ternatisque, caule petiolisque aculeatis. RONCE. *Rubus vulgaris*, sive *r. fructu nigro*. T.

FRAGARIA. cal 10-fidus. petala 5. receptaculum seminum ovatum, baccatum, deciduum.

341. *Vesca*. flagellis reptantibus. FRAISIER. *Fragaria vulgaris*. fr. fructu albo, &c. T.

POTENTILLA. cal. 10-fidus. petala 5. semina subrotunda, nuda, receptaculo parvo exsicco affixa.

342. *Anserina*. foliis pinnatis ferratis, caule repente, pedunculis unifloris. ARGENTINE. *Pentaphylloides argenteum*, alatum, seu potentilla. T.

343. *Reptans*. foliis quinatis, caule repente, pedunculis unifloris. QUINTEFVILLE. *Quinquefolium majus repens*.

TORMENTILLA. cal. 8-fidus. petala 4. sem. subrotunda, nuda, receptaculo parvo exsicco affixa.

344. *Erecta*. caule erectiusculo, foliis sessilibus. TORMENTILLE. *Tormentilla sylvestris*. T.

- GEUM. *cal.* 10-fidus. *petala* 5. *sem.* aristata geniculata.
 345. *Urbanum.* floribus erectis, fructibus globosis villosis: aristis uncinatis nudis, foliis lyratis. BENOITE. Caryophyllata vulgaris. T.
-

CLASSIS XII^a. POLYANDRIA.*-Monogynia.*

- CAPPARIS. *cal.* 4-phyllo, coriacous. *petala* 4.
stam. longa. *bacca* corticosa, locularis pedunculata.

346. *Spinosa.* pedunculis unifloris solitariis, stipulis spinosis, foliis annuis, capsulis ovalibus. CAPRIER. capparis spinosa fructu minore, folio rotundo. c. folio acuto. c. sicula duplicata spina, folio acuto. T.

- ACTÆA. *cor.* 4-petala. *cal.* 4-phyllo. *bacca* 1-locularis. *sem.* semi-orbiculata.

347. *Spicata.* racemo ovato, fructibus baccatis. HERBE DE ST. CHRISTOPHE. Christophoriana vulgaris, nostras, racemosa & ramosa. T. *Spicata nigra.* Christ. americana, baccis niveis . . . rubris. T.

- CHELIDONIUM. *cor.* 4-petala. *cal.* 2-phyllo. Siliqua 1-locularis, linearis.

348. *Majus.* pedunculis umbellatis. GRANDE CHELIDOINE. ECLAIRE. Chelidonium majus vulgare. c. maj. foliis quernis variegatis. T.

349. *Glaucium.* pedunculis unifloris, foliis amplexicaulis sinuatis, caule glabro. PAVOT CORNU. Glaucium flore luteo. T.

- PAPAVER. *cor.* 4-petala. *cal.* 2-phyllo. *caps.* 1-locularis, sub stigmate persistente poris dehiscentes.

350. *Rhaea.* capsulis glabris globosis, caule piloso multifloro, foliis pinnatifidis incisis. COQUELICOT.

44 POLYANDRIA MONOGYNIA.

- Papaver erraticum majus ... minus. T.
351. *Somniferum*. calycibus capsulisque glabris , foliis amplicaulibus incisis. PAVOT. Papaver hortense .. p. cristatum .. p. flore pleno. T.
352. *Orientale*. capsulis glabris , caulis unifloris scabris foliosis , foliis pinnatis serratis. P. ORIENTAL . Papaver orientale hirsutissimum flore magno. T.
- NYMPHÆA. cor. polypetala. cal. 4 f. 5-phyllos. bacca multilocularis truncata.
353. *Lutea*. foliis cordatis integerrimis , calyce petalis majore pentaphyllo. NÉNUPHAR JAUNE. Nymphaea lutea major. T.
354. *Alba*. foliis cordatis integerrimis , calyce quadridito. NÉNUPHAR BLANC. Nympheæ alba major. T.
- TILIA. cor. 5-petala. cal. 5-partitus. bacca sicca , globosa , 5-locularis , 5-valvis , basi dehiscens.
355. *Europæa*. floribus nectario destitutis. TILLEUL. Tilia fœm. fol. majore ... minore. T. foliis molliter hirsutis , viminalibus rubris , fructu tetragono. T.
- THEA. cor. 6-f. 9-petala. cal. 5-f. 6-phyllos caps. 3-cocca.
356. *Bohea*. floribus hexapetalis. THÉ DE CHINE.
- CISTUS. cor. 5-petala. cal. 5-phyllos : foliolis duobus minoribus. capsula.
357. *Laurifolius*. arborescens exstipulatus , foliis oblongo-ovatis petiolatis trinerviis suprà glabris : petiolis basi connatis. CISTE A FEUILLES DE LAURIER. Cistus ledon foliis laurini. T.
358. *Ladaniferus*. arborescens exstipulatus , foliis lanceolatis suprà lævibus : petiolis basi coalitis vaginantibus. CISTE DU LADANUM. Cistus ladanifera hispanica , salicis folio. T.
359. *Montpelienfis*. arborescens exstipulatus , foliis linear-lanceolatis sessilibus utrinque villosis trinerviis. CISTE DE MONTPELLIER. Cistus ladanifera Montpelienfum. C. ledon fol. oleæ sed angustioribus. T.

- CORCHORUS. *cor.* 5-petala. *cal.* 5-phylloides, deciduus
caps. plurivalvis, loculamentosa.
 360. *Oliorius.* capsulis oblongis ventricosis, foliorum
 ferraturis infimis setaceis. MELOCHIE POTAGERE.
 Corchorus sive melochia. T.

Digynia.

- PÆONIA. *cal.* 5-phylloides. petala 5. styli. o. *capf.* Poly-
 spermæ.
 361. *Officinalis.* foliolis oblongis. PIVOINE OFFICINA-
 LE. Pæonia mas. p. fœmina. T.

Trigynia.

- DELPHINIUM. *cal.* o. *pet.* 5. nectarium bifidum,
 postice cornutum. siliquæ 3. f. 1.
 362. *Consolida.* nectariis monophyllis, caule subdiviso.
 PIED D'ALOUETTE DES CHAMPS. Delphinium se-
 getum. T.
 363. *Ajacis.* nectariis monophyllis, caule simplici.
 PIED D'ALOUETTE DES JARDINS. Delphinium
 hortense. T.
 364. *Staphisagria.* nectariis tetraphyllis petalo breviori-
 bus, foliis palmatis : lobis obtusis. HERBE AUX
 POUX. Delphinium platani folio, staphisagria
 dictum. T.
 ACONITUM. *cal.* o. petala 5. supremo fornicato.
 nectaria 2, pedunculata, recurva. si-
 liquæ 3. f. 5.
 365. *Lycocitonum.* foliis palmatis multifidis villosis. ACO-
 NIT TUE LOUP. Acon. lycoctonum luteum. T.
 366. *Napellus.* foliorum laciniis linearibus superne la-
 tioribus, linea exaratis. ACONIT. NAPEL. Aconi-
 tum cærulæum seu napellus. T.
 367. *Anthora.* floribus pentaginis, foliorum laciniis li-
 nearibus. ACONIT ANTHORA. Aconitum salutife-
 rum seu anthora. T.

Pentagynia.

- AQUILEGIA.** *cal. o. petala 5. nectaria 5*, corniculata ,
interpetala , caps. 5 , distinctæ.
 368. *Vulgaris*. nectariis incurvis. ANCOLIE. EGLANTINE. Aquilegia sylvestris. a. hortensis. T.
NIGELLA. *cal. o. petala 5. nectaria 5*, 3-fida intrà
corollam. caps. 5 , connexæ.
 369. *Sativa*. pistillis quinis capsulis muricatis subrotundis , foliis subpilosis. TOUTE ÉPICE. Nigella flore minore simplici caudido. n. fl. min. pleno & albo. T.
 370. *Arvensis*. pistillis quinis , petalis integris , capsulis turbinatis. NIELLE DES CHAMPS. Nigella arvensis cornuta.

Polygynia.

- ANEMONE.** *cal. o. petala 6-9. sem. plura.*
 371. *Hepatica*. foliis trilobis integerimis. ANEMONE HÉPATIQUE. Ranunculus tridentatus , vernus , flore simplici cœrulæo . . . violaceo . . . subpurpureo . . . rubro , &c. flore pleno . . . variegato. T.
 372. *Pulsatilla*. pedunculo involucrato , petalis rectis , foliis bipinnatis. COQUELOURDE. PULSATILLE. Pulsatilla flore crassiore & majore flore. T.
 373. *Pratensis*. pedunculo involucrato , petalis apice reflexis , foliis bipinnatis. ANEMONE DES PRÉS. pulsatilla flore minore nigricante. T.
 374. *Nemorosa*. seminibus acutis , foliolis incisis , caule unifloro. ANEMONE DES BOIS. SILVIE. Ranunculus phragmites albus vernus . . . purpureus vernus. T.
CLEMATIS. *cal. o. petala 4 , rarius 5. sem. caudata.*
 375. *Vitalba*. foliis pinnatis : foliolis cordatis scandentibus. CLEMATITE DES HAIES. HERBE AUX GUEUX. Clematitidis sylvestris latifolia . . . foliis non incisis. T.

376. *Flammula*. foliis inferioribus pinnatis laciniatis : summis simplicibus integerrimis lanceolatis. HERBE AUX GUEUX BRULANTE. *Clematitis* sive *flam-mula repens* . . . *surrecta alba*. T.
- THALICTRUM*. *cal.* o. *petala 4*. f. 5. *semina ecaudata*.
377. *Flavum*. caule folioso sulcato , panicula multiplici erecta. RHUE DES PRÉS. PEGAMON. FAUSSE RHUBARBE. *Thalictrum majus* , siliquâ angulosâ aut striatâ.
- ADONIS*. *cal.* 5-phyllo. *petala* quinis plura absque nectario. *sem.* nuda.
378. *Aestivalis*. floribus pentapetalis , fructibus ovatis. *ADONIS D'ÉTÉ*. *Ranunculus arvensis* , foliis chamaemeli , flore phœnicio . . . flore citrino. T.
379. *Vernalis*. flore dodecapetalo : fructu oyato. *ADONIS PRINTANIER*. HELLEBORE D'HYPOCRATE. *Ranunculus fœniculaceis* foliis , hellebori nigri radice. T.
- RANUNCULUS*. *cal.* 5-phyllo. *petala* 5 , intrà unguis poro mellifero. *sem.* nuda.
380. *Flammula*. foliis ovato-lanceolatis petiolatis , caule declinato. RENONCLE FLAMME. *Ranunculus longifolius palustris minor*. r. *palustris ferratus*. T.
381. *Ficaria*. foliis cordatis angulatis petiolatis , caule unifloro. PETITE CHELIDOINE. *Ranunculus vernus rotundifolius major* . . . *minor*. T.
382. *Sceleratus*. foliis inferioribus palmatis ; summis digitatis , fructibus oblongis. RENONCLE SCÉLÉRATE. REN. DES MARAIS. PIED-POU. *R. palustris* , apii folio , lœvis. T.
383. *Acris*. calycibus patulis , pedunculis teretibus , foliis tripartito multifidis : summis linearibus. RENONCLE ACRE. BOUTON D'OR. *R. pratensis* erectus acris. T.
384. *Aquatalis*. foliis submersis capillaceis , emersis peltatis. RENONCLE AQUATIQUE. *R. aquaticus* folio rotundo & capillaceo. *R. aquaticus capilla-*

ceus. R. aq. albus, fluitans, peucedani foliis. T.
HELLEBORUS. *cal.* o. petala 5-f. plura. nectaria bilabiata, tubulata. *caps.* polyspermæ, erectiusculæ.

385. *Niger.* scapo subbifloro subnudo, foliis pedatis. *HELLEBORE NOIR.* Helleborus niger angustioribus foliis. T.
386. *Viridis.* caule bifido, ramis foliosis bifloris, foliis digitatis. *HELLEBORE VERD.* Helleborus niger hortensis, flore viridi. T.
387. *Fætidus.* caule multifloro folioso, foliis pedatis. *HELLEBORE PUANT.* *PIED DE GRIFFON.* Helleborus niger fætidus. T.
-

CLASSIS XIV^a. DIDYNAMIA.*Gymnospermia.*

- A**JUGA. *corollæ labium superius minimum.* Stamina labio superiore longiora.
388. *Pyramidalis.* tetragono pyramidalis villosa, foliis radicalibus maximis. *BUGLE PYRAMIDALE.* Bugula sylvestris, villosa, flore suave rubente. T.
389. *Reptans.* stolonibus reptantibus. *Glabra.* *BUGLE RAMPANTE.* Bugula. T.
- TEUCRIUM.** *corollæ labium superius (nullum) ultrà basin bipartitum, divaricatum ubi stamina.*
390. *Chamæpithys.* foliis trifidis linearibus integerrimis, floribus sessilibus lateralibus solitariis, caule diffuso. *GERMANDRÉE IVETTE.* Chamæpitys lutea vulgaris, sive folio trifido. ch. vulg. fol. trifid. flore roseo, lusitanica. T.
391. *Iva.* foliis subtricuspidatis linearibus, floribus sessilibus, lateralibus solitariis. *IVETTE MUSQUÉE.* Chamæpitys moschata foliis serratis. T.

392. *Marum.* foliis integerrimis ovatis acutis petiolatis : subtustomentosis , floribus racemosis secundis. MARUM. HERBE AUX CHATS. Chamædrys maritima incana frutescens foliis lanceolatis. T.
393. *Scorodonia.* foliis cordatis serratis petiolatis , racemis lateralibus secundis , caule eretto. FAUX SCORDIUM. SAUGE SAUVAGE. Chamædrys fruticosa , sylvestris , melissæ folio. T.
394. *Scordium.* foliis oblongis sessilibus dentato-serratis , floribus geminis axillaribus pedunculatis , caule diffuso. SCORDIUM: Chamædrys palustris canescens , seu scordium officinarum. T.
395. *Chamædrys.* foliolis cuneiformi-ovatis incisis crenatis petiolatis , floribus ternis , caulibus procumbentibus subpilosis. GERMANDRÉE. PETIT CHENE. Chamædrys major repens. ch. min. repens. T.
396. *Montanum.* corymbo terminali , foliis lanceolatis integerrimis subtus tomentosis. POLIUM DE MONTAGNE. Polium lavandulæ folio. T.
397. *Polium.* capitulis subrotudinis , foliis oblongis obtusis crenatis tomentosis sessilibus , caule prostrato. POLIUM A FLEUR JAUNE. P. A FL. BLANCHE. Pol. montanum album . . p. m. luteum. p. m. superbum alterum. p. marit. venetum. T.
- SAUREIA. cor. laciniæ subæquales. flam. distantia.
398. *Hortensis.* pedunculis bifloris. SARIETTE. Satureia sativa. T.
- HYSSOPUS. cor. labium inferius lacinia intermedia crenata. flam. recta , distantia.
399. *Officinalis.* spicis secundis : foliis lanceolatis. HYSOPE. Hyssopus officinarum cærulea seu spicata. H. rubro flore. T.
- NEPETA. corollæ lab. inferius lacinula intermedia crenata , faux margine reflexo. flam. approximata.
400. *Cataria.* floribus spicatis , verticillis subpedicellatis , foliis petiolatis cordatis , dentato-serratis. HERBES

AUX CHATS. Cataria major vulgaris. c. minor
vulg. T.

LAVANDULA. cal. ovatus , subdentatus , bractea suffultus. corolla resupinata. stamina intrà tubum.

401. Spica. foliis lanceolatis integerrimis , spicis nudis. LAVANDE MALE. L. FEMELLE. ASPIC. NARD. Lavandula latifolia . . . angustifolia. T.

402. Stœchas. foliis lanceolato-linearibus , integerrimis , spicis comosis. STŒCHAS. Stœchas purpurea. Stœchas caulinis non foliatis. T.

MENTHA. cor. subæqualis , 4-fida : lacinia latiore emarginata. stamina erecta distantia.

403. Viridis. spicis oblongis , foliis lanceolatis nudis serratis sessilibus , staminibus corolla longioribus. MENTHE VERTE. M. D'ANGLETERRE. Mentha angustifolia spicata. in. sylvestris , longioribus , nigrioribus & minus incanis foliis. T.

404. Rotundifolia. Spicis oblongis , foliis subrotundis rugosis crenatis sessilibus. MENTHE SAUVAGE. MENTHASTRE. Mentha sylvestris rotundiore folio. T.

405. Aquatica. floribus capitatis , foliis ovatis serratis petiolatis , staminibus corolla longioribus. MENTHE AQUATIQUE. Mentha rotundifolia , palustris seu aquatica , major. T.

406. Piperita. spicis capitatis , foliis ovatis serratis petiolatis , staminibus corolla brevioribus MENTHE POIVRÉE.

407. Gentilis. floribus verticillatis , foliis ovatis acutis serratis , staminibus corolla brevioribus. BAUME DES JARDINS. Mentha hortensis verticillata ocyini odore. T.

408. Pulegium. floribus verticillatis , foliis ovatis obtusis subcrenatis , caulis subteretibus repentibus , staminibus corolla longioribus. POULIOT A LARGES FEUILLES. Mentha aquatica seupulegium vulgare. T.

409. *Cervina*. floribus verticillatis, bracteis palmatis, foliis linearibus, staminibus corolla longioribus. POULIOT A FEUILLES ÉTROITES. *Mentha aquatica* satureiæ folio. Γ.

GLECOMA. *antherarum* singulum par in formam crucis cunnivens. cal. 5-fidus.

410. *Hederacea*. foliis reniformibus crenatis. LIERRE TERRESTRE. *Calamintha humilior* folio rotundore. T.

LAMIUM. cor. labium superius integrum, fornicatum; lab. inf. 2-lobum; faux uniuersus margine dentata.

411. *Album*. foliis cordatis acuminatis serratis petiolatis, verticillis viginti-floris. ORTIE BLANCHE. AR-CHANGELIQUE. *Lamium vulgare*, album, sive archangelica, flore albo. T.

412. *Purpureum*. foliis cordatis obtusis petiolatis. LAMIER POURPRE. *Lamium purpureum* fœtidum folio subrotundo. T.

GALEOPSIS. *corollæ* labium superius subcrenatum, fornicatum; lab. inf. supra 2-dentatum.

413. *Galeobdolon*. verticillis sexfloris; involucro tetraphyllo. ORTIE MORTE A FLEUR JAUNE. Galeopsis sive urtica iners flore luteo. Γ.

BETONICA. cal. aristatus. *corollæ* labium superius adscendens, planiusculum; tubus cylindricus.

414. *Officinalis*. spica interrupta, corollarum labii lacinia intermedia emarginata. BÉTOINE. *Betonica purpurea*. b. alba. T.

STACHYS. cor. lab. superius fornicatum, lab. infer. lateribus reflexum: intermedia majore emarginata. *Stam.* deflorata versus latera reflexa.

415. *Sylvatica*. verticillis sexfloris, foliis cordatis petiolatis. ORTIE MORTE DES BOIS. *Galeopsis procerior*, fœtida spicata. T.

416. *Palustris*. verticillis sub-sex floris, foliis linearis.

lanceolatis semi-amplexicaulibus sessilibus. ORTE
MORTE DES MARAIS. Galeopsis palustris , beto-
niæ folio , flore variegato. T.

417. *Germanica*. verticillis multifloris , foliorum serratu-
ris imbricatis , caule lanato. ÉPI FLEURI. STACHIS
LANUGINEUX. Stachys major , germanica. T.
BALLOTA. *cal.* hypocrateriformis , 5-dentatus , 10-
striatus. *corollæ* lab. super. crenatum ,
concavum.

418. *Nigra*. foliis cordatis indivisis serratis , calycibus
acuminatis. MARRUBE NOIR. Ballote. T.

MARRUBIUM. *cal.* hypocrateriformis , rigidus , 10-
striatus. *corollæ* lab. super. bifidum ,
lineare , rectum.

419. *Vulgare*. dentibus calycinis setaceis uncinatis.
MARRUBE BLANC. Marrub. album vulgare. M.
alb. villosum. T.

420. *Pseudo-Dictamnus*. calycum limbis planis villosis ,
foliis cordatis concavis , caule fruticoso. FAUX
DICTAME. Pseudo-Dictamnus verticillatus inodo-
rus. T.

LEONURUS. antheræ punctis nitidis , adspersæ.

421. *Cardiaca*. foliis caulinis lanceolatis trilobis. AGRI-
PAUME. Cardiaca T. Cardiaca flore albo. T.

PHLOMIS. *cal.* angulatus. *corollæ* labium superius in-
cumbens , compressum , villosum.

422. *Fruticosa*. foliis subrotundis tomentosis crenatis ,
involucris lanceolatis , caule fruticoso. BOUILLON
SAUVAGE. SAUGE EN ARBRE. Phlomis fruticosa ,
salviæ folio latiore & rotundiore. T.

MOLUCELLA. *calyx* campanulatus , ampliatus , ce-
rolla latior , spinosus.

423. *Lævis*. calycibus campanulatis sub quinque den-
tatis : denticulis æqualibus. MELISSE DES MOLU-
QUES. Molucca lœvis. T.

424. *Spinosa*. calycibus ringentibus octodentatis. MO-
LUQUE ÉPINEUSE. Molucca spinosa. T.

CLINOPODIUM. *involucrum* multisetum , verticillo
subjectum.

425. *Vulgare*. capitulis subrotundis hispidis, bracteis setaceis. GRAND BASILIC SAUVAGE. *Clinopodium origano* simile, elatius, majore folio. T.
- ORIGANUM. Strobilus tetragonus, spicatus, calyces colligens.
426. *Dictamnus*. foliis inferioribus tomentosis, spicis nutantibus. DICTAME DE CRETE. *Origanum creticum*, latifolium, tomentosum, seu dictamnus creticus. T.
427. *Vulgare*. spicis subrotundis paniculatis conglomeratis, bracteis calyce longioribus ovatis. ORIGAN. *Origanum sylvestre*, cunila bubula plinii. T.
428. *Marjana*. foliis obtusis, spicis subrotundis compactis pubescentibus. MARJOLAIN. *Majorana vulgaris*. T.
- THYMUS. calycis bilabiati faux villis clausa.
429. *Serpillum*. floribus capitatis, caulis repentibus, foliis planis obtusis basi ciliatis. SERPOLET. *Serpilli undecim priores species*. T.
430. *Vulgaris*. erectus, foliis revolutis ovatis, floribus verticillatis spicatis. THIM. COMMUN. *Thymus vulgaris* folio latiore .. fol. tenuiore. th. supinus candicans odoratus. th. capitulis minoribus massiliensis. T.
431. *Acinos*. floribus verticillatis, pedunculis unifloris, caulis erectis subramosis, foliis acutis ferratis. THIM CHAMPETRE. *Clinopodium arvense* ocymi facie. T.
432. *Mastichina*. floribus verticillatis, calycibus lanuginosis: dentibus calycinis setaceis villosis. MARJOLAIN D'ANGLETERRE. *Thymbra hispanica*, majoranæ folio. T.
- MELISSA. *calyx* aridus, suprà planiusculus: labio superiore sub fastigiato. corollæ labium superius subfornicatum, 2-fidum; labium inferius lobo medio cordato.
433. *Officinalis*. racemis axillaribus verticillatis: pedi-

cellis simplicibus. MELISSE. CITRONNELLE. Melissa hortensis. T.

434. *Grandiflora*. pedunculis axillaribus dichotomis longitudine florum. GRAND CALAMENT DE MONTAGNE. Calamintha magno flore. T.

435. *Calamintha*. pedunculis axillaribus dichotomis longitudine foliorum. CALAMENT. Calamintha vulgaris vel officinarum germaniae. T.

436. *Nepeta*. pedunculis axillaribus dichotomis folio longioribus , caule adscendente hirsuto. CALAMENT A ODEUR DE POULIOT. Calamintha pulegii odore sive nepeta. c. montana præalata ; &c. T. DRACOCEPHALUM. Corollæ faux inflata , labium superius concavum.

437. *Canariense*. floribus spicatis , foliis compositis. MELISSE DE CANARIE. Moldavica americana , trifolia , odore gravi. T.

438. *Moldavica*. floribus verticillatis , bracteis lanceolatis : serraturis capillaceis. MELISSE DE MOLDAVIE. Moldavica betonicæ folio , flore cœrulæo. T.

MELITTIS. *calyx* tubo corollæ amplior. *corollæ* labium superius planum : lab. infer. crenatum. antheræ cruciatæ.

439. *Melissophyllum*. MELISSE DES BOIS. Melissa humilis , latifolia , maximo flore purpurascente. T.

OCYMUM. *Calyx* labio superiore orbiculato ; inferiore quadrifido. *corollæ* resupinatæ alterum labium 4-fidum ; alterum indivisum. Filamenta exteriora basi processum emitentia.

440. *Basilicum*. foliis ovatis glabris , calycibus ciliatis. GRAND BASILIC. Ocymum cariophyllum maximum. oc. car. majus. T.

441. *Minimum*. foliis ovatis integerrimis. PETIT BASILIC. Ocyn. minimum. T.

SCUTELLARIA. *Calyx* ore integro : post florescentiam clauso , operculato.

442. *Galericulata*. foliis cordato-lanceolatis crenatis , floribus axillaribus. TOQUE DES MARAIS. Cassida palustris vulgarior , flore cœruleo. T.
- PRUNELLA. *Filamenta bifurca* : altero apice antherifera. *stigma bifidum*.
443. *Vulgaris*. foliis omnibus ovato-oblongis serratis petiolatis. BRUNELLE COMMUNE. Brunellæ 7 prioris species. T.

Angiospermia.

- EUPHRASIA. *cal.* 4-fidus cylindricus. *caps.* 2-locularis , ovato-oblonga. *antheræ inferiores* altero lobo basi spinosæ.
444. *Officinalis*. foliis ovatis lineatis argute dentatis. EUPHRAISE. Euphrasia officinarum. T.
- ANTIRRHINUM. *cal.* 5-phyllo. *corollæ basis deorsum prominens*, nectarifera. *caps.* bilocularis.
445. *Cymbalaria*. foliis cordatis quinquelobis alternis , caulis procumbentibus. CYMBALAIRE. Linaria hederaceo folio glabro seu cymbalaria vulgaris. T.
446. *Elatine*. foliis hastatis alternis , caulis procumbentibus. VELVOTE. Linaria segetum nummulariæ folio aurito & villoso , flore luteo . . . fl. cœruleo. T.
447. *Spurium*. foliis ovatis alternis , caulis procumbentibus. VELVOTE FEMELLE. Linaria segetum nummulariæ folio villoso. T.
448. *Linaria*. foliis lanceolato-linearibus confertis , caule erecto , spicis terminalibus sessilibus , floribus imbricatis. LINAIRO COMMUNE. Linaria vulgaris lutea flore majore. T.
449. *Majus*. corollis ecaudatis. MUFLE DE VEAU. Antirrh. vulgare. T.
- SCROPHULARIA. *cal.* 5-fidus , *cor.* subglobosa , resupinata. *caps.* 2-locularis.
450. *Nodosa*. foliis cordatis trinervatis , caule obtusang-

sanguulo. *SCROPHULAIRE DES BOIS*. Scrophul. nodosa fœtida. T.

451. *Aquatica*. foliis cordatis petiolatis decurrentibus obtusis, caule membranis angulato racemis terminalibus. *SCROPHULAIRE AQUATIQUE*. Scrophularia aquatica major. T.

DIGITALIS. *cal.* 5-partitus. *cor.* campanulata, 5-fida, ventricosa. *caps.* ovata, 2-locularis.

452. *Purpurea*. L. T. calycinis foliolis ovatis acutis, corollis obtusis: labio superiore integro. *DIGITALE*.

CAPRARIA. *cal.* 5-partitus. *cor.* campanulata, 5-fida, acuta. *caps.* 2-valvis, 2-locularis, polysperma.

453. *Biflora*. foliis alternis, floribus geminis. *THÉ DE CURAÇAO*. Ageratum americanum folio & facie rapunculi. T.

OROBANCHE. *cal.* 2-fidus. *cor.* ringens. *caps.* 1-locularis, 2-valvis, polyperma. Glaudulæ sub basi germinis.

454. *Major*. caule simplicissimo pubescente, staminibus subexsertis. *GRANDE OROBANCHE*. Orobanche major caryophyllum olens. T.

VITEX. *cal.* 5-dentatus. *cor.* limbus 6-fidus. *bacca* 4-sperma.

455. *Agnus castus*. foliis digitatis serratis, spicis verticillatis. *AGNUS CASTUS*. Vitex latiore folio. v. fol. angustioribus cannabis modo dispositis. T.

ACANTHUS. *cal.* bifol. bifidus. *cor.* 1-labiata, deflexa 3-fida. *caps.* 2-locularis.

456. *Mollis*. foliis sinuatis inermibus. *ACANTE*. *BRANCURSINE*. Acanthus sativus vel mollis virgilii. T.



CLASSIS XV^a. TETRADYNA MIA.*Siliculosa.*

MYAGRUM. *Silicula* stylo conico terminata, loculo submonospermo.

457. *Sativum*. siliculis obovatis pedunculatis polyspermis. CAMELINE CULTIVÉE. Alysson segetum, foliis auriculatis, acutis. T.

ANASTATICA. *Silicula* retusa, margine coronata valvulis dissepimento duplo longioribus. stylo intermedio mucronato, obliquo, loculis 1-spermis.

458. *Hierochuntica*. foliis obtusis, spicis axillaribus brevissimis, siliculis angulatis spinosis. ROSE DE JERICO. Thlaspi rosa de Hiericho dictum. T.

LEPIDIUM. *Silicula* emarginata, cordata, polysperma : valvulis carinatis, dissepimento contrariis.

459. *Sativum*. floribus tetradynamis, foliis oblongis multifidis. NASITOR. CRESSON ALENOIS. Nasturtium hortense, vulgatum. n. h. crispum. T.

460. *Latifolium*. L. T. foliis ovato-lanceolatis integris serratis. GRANDE PASSERAGE.

461. *Iberis*. floribus diandris tetrapetalis, foliis inferioribus lanceolatis serratis : superioribus linearibus integrerimis. PETITE PASSERAGE. Lepidium gramineo folio, sive ibetis. T.

THLASPI. *silicula* emarginata, obcordata, polysperma, valvulis navicularibus, marginato carinatis.

462. *Arvense*. siliculis orbiculatis, foliis oblongis dentatis glabris. SENEVE SAUVAGE. MONOYERE. Thlaspi arvense, siliquis latis. T.

463. *Campestre*. siliculis tubrotundis, foliis sagittatis

58 TETRADYNA MIA SILICULOSA.

dentatis incanis. THLASPI CHAMPETRE. Thlaspi vulgatius. thl. vaccariæ incano folio minus. T.

464. *Bursa-pastoris*. siliculis obcordatis, foliis radicalibus pinnatifidis. TABOURET. BOURSE A PASTEUR. Bursa pastoris major folio sinuato. b. p. m. fol. non sinuato. b. p. media. T.

COCHLEARIA. *Silicula* emarginata, turgida, scabra; valvulis gibbis, obtusis.

465. *Officinalis*. foliis radicalibus cordato-subrotundis, caulinis oblongis subsinuatis. COCHLEARIA HERBB AUX CUILLERS. Cochlearia folio subrotundo. T.

466. *Coronopus*. foliis pinnatifidis, caule depresso. COCHLEARIA RAMPANT. Nasturtium sylvestre capsulis cristatis. T.

467. *Armoracia*. foliis radicalibus lanceolatis crenatis, caulinis incisis. GRAND RAIFORT SAUVAGE. Cochlearia folio cubitali. T. Raphanus rusticana officinarum.

BISCUTELLA. *Silicula* compresso-plana, rotundata, suprà infràque biloba. cal. foliola basi gibba.

468. *Apula*. siliculis scabris, foliolis lanceolatis sessilibus serratis. LUNETIERE. Thlaspidium Monspellense, hieracii folio hirsuto. thasp. apulum, spicatum. T.

LUNARIA. *Silicula* integra elliptica, compresso-plana, pedicellata; valvis dissepimento æqualibus parallelis, planis. cal. foliolis siccatis.

469. *Rediviva*. foliolis alternis. LUNAIRE ODORANTE. Lunaria major siliqua longiore. T.

Siliquosa.

DENTARIA. *Siliqua* elastice dissiliens valvulis revolutis. stigma. emarginatum. cal. longitudinaliter connivens.

470. *Pentaphyllum*. foliis summis digitatis. DENTAIRE

- Dentaria heptaphyllos. d. pentaphyllos foliis mollioribus. d. p. fol. asperis. T.
- CARDAMINE. *Siliqua* elastice dissiliens valvulis revolutis. *stigma* integrum. *cal.* subhians.
471. *Hirsuta*. foliis pinnatis, floribus tetrandris. *PETIT CRESSON D'EAU*. Cardamine quarta dalechampii. T.
472. *Amara*. foliis pinnatis, axillis stoloniferis. *GRAND CRESSON D'EAU*. Cardamine flore majore, elatior. T.
- SISYMBRIUM. *siliqua* dehiscens valvulis rectiusculis. *calyx* patens. *corolla* patens.
473. *Nasturtium*. siliquis declinatis, foliis pinnatis foliolis subcordatis. *CRESSON DE FONTAINE*. Sisymbrium aquaticum. T.
474. *Tenuifolium*. foliis integerimis, infimis tripinnatifidis; supremis integris. *ROQUETTE SAUVAGE VIVACE*. Eruca tenuifolia, perennis, flore luteo. T.
475. *Sophia*. petalis calyce minoribus, foliis decomposito-pinnatis. *THALICTRON DES BOUTIQUES*. Sisymbrium annum, absinthii minoris folio. T.
- ERYSIMUM. *Siliqua* columnaris, &c. Etè tetraëdra. *cal.* clausus.
476. *Officinale*. Siliquis spicæ adpressis, foliis runcinatis. *VELAR TORTELLE*. Erysimum vulgare. T.
477. *Barbarea*. foliis lyratis ex timo subrotundo. *HERBE DE STE. BARBE. RONDOTE*. Sisymbrium erucæ folio glabro, flore luteo. T.
478. *Alliaria*. foliis cordatis. *ALLIAIRE*. Hesperis alium redolens. T.
- CHEIRANTHUS. *Germen* utrinque denticulo glandulato. *cal.* clausus: foliolis basi gibbis. *semina* plana.
479. *Cheiri*. foliis lanceolatis acutis glabris, ramis angulatis, caule fruticoso. *GIROFLÉE JAUNE*. Leucocium luteum vulgare. T.
- HESPERIS. *Petala* oblique flexa. *Glandula* intrà sta-

mina breviora. Siliqua stricta. *Stigma* basi bifurca apice connivente. *cal.* clausus.

480. Matronalis. caule simplici erecto , foliis ovato-lanceolatis denticulatis , petalis mucrone emarginatis. JULIENNE GIRARDE. Hesperis hortensis. T.

TURRITIS. Siliqua longissima , augulata. *cal.* connivens erectus. *cor.* erecta.

481. Hirsuta. foliis omnibus hispidis , caulinis amplexicaulibus. TOURRETTE VELUE. Turritis minor. T.

BRASSICA. *cal.* erectus connivens. *sem.* globosa. *Glandula* inter stamina breviora & pistillum , interque longiora & calycem.

482. Napus. radice caulescente fusiformi. NAVET. *Napus sativa.* n. sylvestris. T.

483. Rapa. radice caulescente orbiculari depressa carnosa. RAVE. *Rapa sativa rotunda . . . oblonga.* T.

484. Oleracea. radice caulescente tereti carnosa. CHOU POTAGER. *Brassica capitata alba , &c.* T.

485. Eruca. foliis lyratis , caule hirsuto , siliquis glabris. ROQUETTE. *eruca latifolia alba.* T.

SINAPIS. *cal.* patens. *cor.* unguis recti. *glandula* inter stamina breviora & pistillum , interque longiora & calycem.

486. Arvensis. siliquis multangulis , toroso turgidis rostro ancipite longioribus. MOUTARDE DES CHAMPS. *sinapi arvense præcox , semine nigro.* T.

487. Nigra. siliquis glabris racemo appressis. MOUTARDE NOIRE. *sinapis rapi folio.* T.

488. Lævigata. siliquis laevibus patulis , foliis lyratis glabris : summis lanceolatis , caule laevi. MOUTARDE LISSE.

RAPHANUS. *cal.* clausus. *siliqua* torosa , subarticulata , teres. *Glandulæ melliferæ* 2 inter stamina breviora & pistillum , totidem inter stamina longiora & calycem.

489. Sativus. siliquis teretibus torosis bilocularibus. RAI FORT. RADIS CULTIVÉ. *Raphanus major orbicularis vel rotundus. id. floribus candidis. r. niger,* minor , oblongus. T.

490. *Raphanistrum*. siliquis teretibus articulatis, lœvibus unilocularibus. RADIS SAUVAGE. RAPISTRE. Raphanistrum siliqua articulata glabra majore & minore. r. fl. albo. r. segetum. T.
- BUNIAS. *Silicula* decidua, tretraëdra, angulis inæquilibus acuminatis muricata.
491. *Erucago*. siliculis tetragonis, angulis bicristatis. MASSE DU BEDEAU. Erucago segetum. T.
492. *Cakile*. siliculis ovatis, lœvibus, ancipitibus. ROQUETTE DE MER. Cakile maritima ampliore (angustiore) folio. T.
- ISATIS. *Siliqua* lanceolata, unilocularis, r. sperma, decidua, bivalvis : valvulis navicularibus.
493. *Tindoria*. foliis radicalibus crenatis : caulinis sagittatis, siliculis oblongis. PASTEL. Isatis sativa vel latifolia. i. sylvestris vel angustifolia. T.
-

CLASSIS XVI^a. MONADELPHIA.*Decandria.*

- G**ERANIUM. Monogyna. stygmata 5. fructus rostratus, 5-coccus.
494. *Cicutarium*. pedunculis multifloris, floribus pentandris, foliis pinnatis incisis obtusis, caule ramoso. BEC DE GRUE CICUTAIRE. Geranium cicutæ folio minus & supinum. T.
495. *Moschatum*. pedunculis multifloris, floribus pentandris foliis pinnatis incisis, cotyledonibus pinnatifidis. BEC DE GRUE MUSQUÉ. Ger. cicutæ folioschatum. T.
496. *Robertianum*. pedunculis bifloris, calycibus pilosis decem angulatis. BEC DE GRUE A ROBERT. Geran. robertianum viride . . . rubens. T.
497. *Columbinum*. pedunculis bifloris folio longioribus, foliis quinque partito-multifidis, arillis glabris,

- calycibus aristatis. BEC DE GRUE. PIED DE PIÈGEON. Geran. columbinum dissectis foliis, pediculis florum longissimis. T.
 498. *Sanguineum*. pedunculis unifloris, foliis quinque-partitis trifidis orbiculatis. BEC DE GRUE SANGUIN. Geranium sanguineum maximo flore. T.

Polyandria.

- SIDA. *cal.* simplex, angulatus. stylus multipartitus.
caps. plures, 1-spermæ.
499. *Abutilon*. foliis subrotundo-cordatis indivisis, pedunculis folio brevioribus, capsulis multilocularibus: corniculis bifidis. FAUSSE GUIMAUVE. Abutilon. T.
- ALTHÆA. *cal.* duplex: exterior 9-fidus. arilli plurimi, monospermi.
500. *Officinalis*. foliis simplicibus tomentosis. GUIMAUVE. Althæa dioscoridis & plinii. T.
- ALCEA. *cal.* duplex: exterior 6-fidus. arilli plures monospermi.
501. *Rosea*. foliis sinuato angulosis. MAUVE ROSE. Malva rosea folio subrotundo. T.
- MALVA. *cal.* duplex: exterior 3-phyllus. arilli plurimi, monospermi.
502. *Rotundifolia*. caule prostrato, foliis cordato-orbiculatis obsolete quinquelobis, pedunculis fructiferis declinatis. MAUVE A FEUILLES RONDES. Malva vulgaris, flore minore folio rotundo. T.
503. *Sylvestris*. caule erecto herbaceo, foliis septemlobatis acutis, pedunculis petiolisque pilosis. MAUVE SAUVAGE. Malva vulgaris, flore majore, folio sinuato. T.
- LAVATERA. *cal.* duplex: exterior 3-fidus. arilli plurimi monospermi.
504. *Arborea*. caule arboreo, foliis septem angularibus tomentosis plicatis, pedunculis confertis unifloris axillaribus. MAUVE EN ARBRE. Althæa maritima, arborea, veneta. T.

- GOSSYPIUM. *cal.* duplex : exterior 3-fidus. *caps.* 4-locularis. *sem.* lana obvoluta.
505. *Herbaceum.* foliis quinquelobis, subtus eglandulosis, caule herbaceo lævi. COTONNIER EN HERBE. Xylon sive goffypium herbaceum. T.
506. *Arboreum.* foliis palmatis : lobis lanceolatis, caule fruticoso. COTONNIER EN ARBRE. Xylon arboreum. T.
- HIBISCUS. *cal.* duplex : exterior polyphyllus. *caps.* 5-locularis, polysperma.
507. *Abelmoschus.* foliis subpeltato cordatis septem angularibus ferratis, caule hispido. T. KETMIE D'ÉGYPTE. Ketmia ægyptiaca, semine moschato. T.
-

CLASSIS XVII^a. DIADELPHIA.*Hexandria.*

- FUMARIA. *cal.* diphyllus. *cor.* ringens. filamenta 2, membranacea, singula antheris 3.
508. *Officinalis.* pericarpiis monospermis racemosis ; caule diffuso. FUMETERRE. Fumaria officinarum & dioscoridis. T.

Octandria.

- POLYGALA. *cal.* 5-phillus : foliolis duobus alæformibus, coloratis, legumen obcordatum, biloculare.
509. *Vulgaris.* floribus cristatis racemosis, caulibus herbaceis simplicibus procumbentibus, foliis linearilanceolatis. POLYGALE COMMUN. Polygala major. p. vulgaris. T.

Decandria.

- SPARTIUM. Stigma longitudinale, supra villosum.

Filamenta germini adhærentia. cal. dcor-
sum productus.

510. *Junceum*. ramis oppositis teretibus apice floriferis,
foliis lanceolatis. GENET D'ESPAGNE. Genista
junccea. T.

511. *Scorpius*. ramis spinosis patentibus, foliis ovatis.
Gouan. GENET ÉPINEUX. Genista spartium spino-
sum majus, primum, flore luteo . . . secundum,
flore pallido . . . tertium, hirsutum. T.

512. *Scoparium*. foliis ternatis solitariisque, ramis incr-
mibus angulatis. GENET A BALAIS. cytiso genista
scoparia vulgaris, flore luteo. T.

GENISTA. cal. bilabiatus : $\frac{2}{3}$. vexillum oblongum à
pistillo staminibusque deorsum reflexum.

513. *Tinctoria*. foliis lanceolatis glabris, ramis striatis
tereiibus erectis. GENET DES TEINTURIERS. Ge-
nist tinctoria germanica. T.

ONONIS. cal. 5-partitus : laciniis linearibus. Vexillum
striatum. Legumen turgidum, sessile. Fila-
menta connata absque fissurâ.

514. *Arvensis* floribus racemosis geminatis, foliis ter-
natis : superioribus solitariis, ramis inermibus
subvillosois. ARRETE BŒUF. *Mitis*. Anonis spinis
carens purpurea . . . candidis floribus. *Spinoso*.
Anonis spinosa flore purpureo . . . fl. albo. T.

515. *Natrix*. pedunculis unifloris aristatis, foliis ter-
natis viscosis, stipulis integerrimis, caule fruticoso.
BUGRANE VISQUEUX. Anonis viscosa spinis carens
lutea major. an. non spinosa fl. luteo variegato.
an. spinis carens lutea minor. T.

ANTHYLLIS. cal. ventricosus. legumen subrotundum,
tectum.

516. *Vulneraria*. herbacea, foliis pinnatis inæqualibus,
capiulo duplicato. VULNÉRAIRE RUSTIQUE. Vul-
neraria rustica. T.

LUPINUS. cal. bilabiatus. antheræ 5 oblongæ; 5
subrotundæ. legumen coriaceum.

517. *Varius.* calycibus semiverticillatis appendiculatis : labio superiore bisido ; inferiore subtridentato. **LUPIN.** Lupinus sylvestris, flore purpureo, semine rotundo vario. T.
- PHASEOLUS.** Carina cum staminibus styloque spiraliter tortis.
518. *Vulgaris.* L. caule volubili, floribus racemosis geminis, bracteis calyce minoribus, leguminibus pendulis. **HARICOT COMMUN.** *Coccineus.* Phaseolus puniceo flore. T.
519. *Nanus.* caule erecto laevi, bracteis calyce majoribus, leguminibus pendulis compressis rugosis. **HARICOT NAIN.** Phaseolus minor siliqua sursum ringente, fructu albo. T.
- PISUM.** *Stylus triangulus*, suprà carinatus pubescens. *Calycis laciniæ superiores 2 breviores.*
520. *Sativum.* petiolis teretibus, stipulis inferne rotundatis crenatis, pedunculis multifloris. **POIS DES JARDINS.** Pisum hortense majus & var. T.
521. *Ochrus.* petiolis decurrentibus membranaceis diphyllis, pedunculis unifloris. **POIS OCRE.** Ochrus folio integro, capræolos emitente, semine subluteo . . . pullo . . . atro. T.
- OROBUS.** *Stylus linearis.* cal. basi obtusus : laciniis superioribus profundioribus, brevioribus.
522. *Vernus.* foliis pinnatis ovatis, stipulis semifagittatis integrerimis, caule simplici. **OROBE PRINTANIER.** Orobis sylvaticus purpureus vernus. T.
- LATHYRUS.** *Stylus planus*, suprà villosus, superne latior. cal. laciniæ superiores 2 breviores.
523. *Cicera.* pedunculis unifloris, cirrhis diphyllis, leguminibus ovatis compressis : dorso canaliculatis. **GESSE CICEROLE.** Lathyrus sativus, flore purpureo. T.
524. *Sativus.* pedunculis unifloris, cirrhis diphyllis tetraphyllisque, leguminibus ovalis compressis dorso bimarginatis. **GESSE CULTIVÉE.** Lathyrus sativus, flore fructuque albo. T.

525. *Tuberosus*. pedunculis multifloris , cirrhis diphyllicis , foliis lanceolatis , leguminibus hirsutis , seminibus scabris. GESSE TUBEREUSE. ANOTTE. GLAND DE TERRE. Lath. arvensis repens tuberosus. T.
- VICIA. *Stigma* latere inferiore transverse barbatum.
526. *Sativa*. leguminibus sessilibus subbinatis erectis , foliis retusis , stipulis notatis. VESCE CULTIVÉE. Vicia sativa , vulgaris , semine nigro. Vicia sativa alba. Nigra semine rotundo nigro. v. vulgaris , acutiore folio , semine parvo nigro. T.
527. *Faba*. caule erecto , petiolis absque cirrhis. FÈVE DES MARAIS. Faba rotunda oblonga. T.
- ERVUM. *cal.* 5-partitus , longitudine corollæ.
528. *Lens*. pedunculis subbifloris , seminibus compressis convexis. LENTILLE. Lens vulgaris , semine subrufa. T.
529. *Ervilia*. germinibus undato-plicatis , foliis imparipinnatis. ERS. Ervum verum. T.
- CICER. *cal.* 5-partitus , longitudine corollæ : laciuiis superioribus vexillo incumbentibus , legumen rhombeum , turgidum , dispermum.
530. *Arietinum*. foliolis serratis. POIS CHICHE. Cicer sativum flore candido & cæt. spec. T.
- CYTISUS. *cal.* 2-labiatus : $\frac{2}{3}$. legumen basi attenuatum.
531. *Laburnum*. racemis simplicibus pendulis , foliolis ovato-oblongis. CYTISE DES ALPES. FAUX ÉBENIER. Cytisus alpinus latifolius , flore racemoso pendulo. T.
- COLUTHEA. *cal.* 5-fidus. Legumen inflatum , basi superiore deliquescentia.
532. *Arborescens*. Arborea foliolis obcordatis. BAGUE NAUDIER.
- GLYCYRRHIZA. *cal.* bilabiatus : $\frac{3}{1}$. legumen ova- tum , compressum.

533. *Glabra.* leguminibus glabris , stipulis nullis , foliolo impari petiolato. REGLISSE. *Glycyrrhiza glabra & germanica* radice repeute. T.
- CORONILLA. *cal.* bilabiatus : $\frac{2}{3}$. dentibus superioribus connatis. *Vexillum* vix alis longius. *Legumen* isthmis interceptum.
534. *Emerus.* fruticosa , pedunculis subtrifloris , corollarum unguibus calyce triplo longioribus caule angulato. SECURIDACA DES JARDINIERS. *Emerus.* T.
- ORNITHOPUS. *Legumen.* articulatum , teres , armatum.
535. *Scorpioides.* foliis ternatis subfessilibus : impari maximo. PIED D'OISEAU. *Ornithopodium portulacæ* folio T.
- HEDYSARUM. *cor.* carina transverse obtusa. *Legumen* articulis monospermis.
536. *Coronarium.* foliis pinnatis , leguminibus articulatis aculeatis nudis rectis , caule diffuso. SAINFOIN D'ESPAGNE. *Hedysarum clypeatum* , flore suaviter rubente. T.
537. *Onobrychis.* foliis pinnatis , leguminibus monospermis aculeatis , corollarum alis calycem æquantibus caule elongato. SAINFOIN. ESPARCETTE. *Onobrychis* foliis viciæ , fructu echinato , major. T.
- INDIGOFERA. *cal.* patens. *corollæ* carina utrinque calcari subulato patulo ! *legumen* lineare.
538. *Tinctoria.* foliis pinnatis obovatis , racemis breviribus , caule suffruticoso. INDIGO. *Anonis americana* , folio latiori subrotundo. T.
- GALEGA. *cal.* dentibus subulatis , subæqualibns. *Legumen* striis obliquis , seminibus interjectis.
539. *Officinalis.* leguminibus strictis erectis , foliolis lanceolatis striatis nudis. RUE DE CHEVRE. *Galega vulgaris* floribus cœrulæis. T.

ASTRAGALUS. *Legumen biloculare , gibbum.*

540. *Glycyphyllos.* caulescens prostratus , leguminibus subtriquetris arcuatis , foliis ovalibus pedunculo longioribus. **ASTRAGALE.** FAUX-REGLISSE. *Astragalus uteus , perennis , procumbens , vulgaris , sive sylvestris.* T.

541. *Monspessulanus.* L. T. acaulis , scapis declinatis , longitudine foliorum , leguminibus subulatis teretibus subarcuatis glabris. **ASTRAGALE DE MONTPELLIER.**

542. *Tragacantha.* caudice arborescente , petiolis spinescentibus. BARBE DE RENARD. *Tragacantha Massiliensis.* T.

PSORALEA. *calyx punctis callosis adspersus , longitudo leguminis monospermi.*

543. *Bituminosa.* foliis omnibus ternatis , foliolis lanceolatis , petiolis laevibus , floribus capitatis. **TREFLE PUANT.** *Trifolium bituum redolens.* T.

TRIFOLIUM. *Flores subcapitati. legumen vix calyce longius non dehiscens , deciduum.*

544. *Melilotus cærulæa.* racemis ovatis , leguminibus seminudis mucronatis caule erecto , spicis oblongis. **LOTIER ODORANT.** *Melilotus major , odorata , flore violaceo.* T.

545. *Melilotus officinalis.* leguminibus racemosis nudis dispermis rugosis acutis , caule erecto. **MELILOT DES BOUTIQUES.** *Melilotus officinarum germaniae. m. o. g. flore albo. m. vulgaris , altissima frutescens , fl. albo . . . fl. luteo.* Γ.

546. *Melilotus italicæ.* leguminibus raceinosis nudis dispermis rugosis obtusis , caule erecto , foliolis integris. **MELILOT D'ITALIE.** *Melilotus italicæ folliculis rotundis.* T.

547. *Repens.* capitulis umbellaribus , leguminibus tetraspermis , caule repente. **TREFLE BLANC RAMPANT.** *Trifolium pratense album.* T.

548. *Pratense.* spicis globosis subvillosis , cinctis sti pulis oppositis membranaceis , corollis monopetalis.

TREFLE DES PRÉS. *Trifolium pratense* flore monopetaloo. T.

549. *Arvense*. spicis villosis ovalibus, dentibus calycinis setaceis villosis æqualibus. TREFLE DES CHAMPS.
PIED DE LIEVRE. *Trifolium arvense*, humili, spicatum, seu lagopus. T.

LOTUS. *legumen*. cylindricum, strictum. *Alæ* sursum longitudinaliter conniventes. *cal.* tubulosus.

550. *Hirsutus* Capitulis subrotundis, caule erecto hirto, leguminibus ovatis. LOTIER HÉMORRHOÏDAL.
Lotus pentaphyllos siliquosus villosus. T.

TRIGONELLA. *Vexillum* & *alæ* subæquales, patentes, forma corollæ tripetalæ.

551. *Fœnum græcum*. leguminibus sessilibus strictis erectiusculis subfalcatis acuminatis, caule erecto. FENU GREC. *Fœnum græcum sativum*. f. g. *sylvestre*. T.

MEDICAGO. *Legumen* compressum, cochleatum.
Carina corollæ à vexillo deflectens.

552. *Arborea*. leguminibus linnatis margine integerimis, caule arboreo. LUZERNE EN ARBRE. Medicago trifolia frutescens incana. T.

553. *Sativa*. pedunculis racemosis, leguminibus contortis, caule erecto glabro. LUZERNÈ CULTIVÉE.
Medica major, erectior, floribus purpureis. T.

CLASSIS XVIII^a. POLYADELPHIA.

Icosandria.

CITRUS. *cal.* 5-fidus. *petala* 5 oblonga. *antheræ* 20, filamentis connatis in varia corpora. *bacca* 9-locularis.

554. *Medica*. petiolis linearibus. CITRONNIER. LIMONIER. *Citreum vulgare*. *Limon vulgaris*. T.

555. *Aurantium*. petiolis alatis, foliis acuminatis.
ORANGER. *Aurantium acri medulla*, *vulgare*. *Aurantium dulci medulla*, *vulgare*. T.
- HYPERICUM**. *cal.* 5-partitus. *petala 5. filamenta multa*, in 5 phalanges basi connata. *capsula*.
556. *Balearicum*. floribus pentagynis, caule fruticoso, foliis ramisque cicatrisatis. *MILLEPERTUIS DE MAIORQUE*.
557. *Androsænum*. floribus trigynis, fructibus baccatis, caule fruticoso ancipiti. *TOUTESAINE*. *Androsænum maximum frutescens*. T.
558. *Perforatum*. floribus trigynis, caule ancipiti, foliis obtusis, pellucido punctatis. *MILLE PERTUIS COMMUN*. *Hypericum vulgare*. T.
-

CLASSIS XIX^a. SYNGENESIA.*Polygamia æqualis.*

- T**RAGOPOGON. *Receptaculum nudum. cal. simplex. pappus. plumosus.*
559. *Pratense*. calycibus corollæ radium æquantibus foliis integris strictis. *SALSIFIX DES PRÉS. BARBE DE BOUC*. *Tragopogon pratense luteum majus minus*. T.
560. *Porrifolium*. calycibus corollæ radio longioribus, foliis integris strictis, pedunculis superne incrassatis. *SALSIFIX DES JARDINS*. *Tragopogon purpureo cœrulæum, porri folio, quod artifi vulgò*. T.
- SCORZONERA**. *Receptaculum nudum. pappus plu-*
mösus. calyx imbricatus squamis mar-
gine scariosis.
561. *Hispanica*. caule ramoso, foliis amplexicaulibus integris, ferrulatis. *SCORZONERE D'ESPAGNE*. *Scorzonera latifolia sinuata*. T.

SONCHUS. Receptaculum nudum. calyx imbricatus ventricosus. pappus pilosus.

562. *Oleraceus.* pedunculis tomentosis, calycibus glabris. *LAITRON DES JARDINS.* Sonchus laevis laciniatus, latifolius . . . augustifolius. f. laevis minor, paucioribus laciniis. f. asper non laciniatus . . . laciniatus . . . folio dentis leonis. T.

LACTUCA. recept. nudum. calyx imbricatus, cylindricus, margine membranaceo. pappus simplex, stipitatus. sem. laevia.

563. *Sativa.* L. T. foliis rotundatis, caulinis cordatis, caule corymboso. *LAITUE DES JARDINS.* Lactuca capitata &c. T.

564. *Virosa.* foliis horizontalibus carina aculeatis dentatis. *LAITUE VIREUSE.* Lactuca sylvestris odore viroso. T.

CHONDRILLA. recept. nudum. cal. calyculatus. pappus simplex, stipitatus. flosculi multiplici serie. sem. muricata.

565. *Juncea.* foliis radicalibus runcinatis, caulinis linearibus integris. *CONDRIILLE VISQUEUSE.* chondrilla juncea viscosa arvensis. T.

LEONTODON. Receptaculum nudum. cal. imbricatus squamis laxiusculis. pappus plumosus.

566. *Taraxacum.* calyce inferne reflexo, foliis runcinatis denticulatis laevis. *PISSENLIT. DENT-DEZION.* Dens leonis latiore (rotundiore) tenuissimo folio. T.

HIERACIUM. Recept. nudum. cal. imbricatus ovatus. pappus simplex, sessilis.

567. *Pilosella.* foliis integerrimis ovatis subtus tomentosis, stolonibus repentibus, scapo unifloro. *PILOSELLE. OREILLE DE SOURIS.* Dens leonis, qui pilosella officinarum. T.

568. *Murorum.* caule ramoso, foliis radicalibus ovatis dentatis; caulino minori. *PULMONAIRE DES FRANÇOIS.* Hieracium murorum, folio pilosissimo . . . minus pilosum. T.

- LAPSANA. *recept.* nudum. *cal.* calyculatus squamis singulis interioribus canaliculatis.
569. *Communis.* Calycibus fructus angulatis, pedunculis tenuibus ramosissimis. HERBE AUX MAMMELLONS. Lapsana. T.
- CATANANCHE. *recept.* paleaceum. *cal.* imbricatus. *pappus* aristatus pappo 5-seto.
570. *Cærulea.* squamis calycinis inferioribus ovatis. CUPIDONE. Catanance quorumdam. c. flore pleno, caruleo. T.
- CICHORIUM. *Receptaculum* subpaleaceum. *calyx* calyculatus. *pappus* sub-5-dentatus, obsolete pilosus.
571. *Intybus.* floribus geminis sessilibus; foliis runcinatis. CHICORÉE SAUVAGE. Cichorium sylvestre, seu officinarum . . . flore albo. T.
572. *Endivia.* floribus solitariis pedunculatis, foliis integris crenatis. CHICORÉE DES JARDINS. Cichorium latifolium, seu endivia vulgaris. T.
- SCOLYMUS. *recept.* palaceum. *cal.* imbricatus, spinosus, *pappus* nullus.
573. *Hispanicus.* floribus congestis. ÉPINE JAUNE. Scolymus chrysanthemos. T.
- ARCTIUM. *cal.* globosus : squamis apice hamis inflexis.
574. *Lappa.* foliis cordatis inermibus petiolatis. BARDAINE COMMUNE. Lappa major, seu arctium dioecoridis. T.
- SERRATULA. *cal.* subcylindricus, imbricatus multilobus.
575. *Tinctoria.* foliis lyrato-pinnatifidis : pinna terminali maxima, flosculis conformibus. SARRETTE DES TEINTURIERS. Jacea nemorensis, quæ serratula vulgò. T.
576. *Arvensis.* foliis dentatis spinosis. SARRETTE DES CHAMPS. CHARDON HÉMORRHOÏDAL. Cirsium arvense, Sonchi folio, radice repeute, flore purpurascente (albo) T.

CARDUUS. *cal.* ovatus, imbricatus squamis spinosis;
recept. pilosum.

577. *Marianus.* folius amplexicaulibus hastato-pinnatifidis spinosis, calycibus aphyllis: spinis canaliculatis duplicato-spinosis. **CHARDON MARIE.** Carduus albis maculis notatus vulgaris. T.

ONOPORDUM. *Receptaculum* favosum. *cal.* squamæ mucronatæ.

578. *Acanthium.* calycibus squarosis, squamis patentibus, foliis ovato-oblongis sinuatis. **PET D'ANE.** **CHARDON A FEUILLES D'ACANTHE.** Carduus tomentosus acanthi folio vulgaris. T.

CYNARA. *cal.* dilatatus, imbricatus squamis carnosis, emarginatis cum acumine.

579. *Scolymus.* foliis subspinosis pinnatis indivisisque, calycinis squamis ovatis. **ARTICHAUD.** Cynara hortensis foliis non aculeatis . . . fol. aculeatis. cynara sylvestris latifolia. T.

580. *Cardunculus.* foliis spinosis: omnibus pinnatifidis, calycinis squamis ovatis. **CARDON D'ESPAGNE.** Cynara spinosa cujus pediculi esitantur. T.

CARLINA. *cal.* radiatus squamis marginalibus longis, coloratis.

581. *Acaulis.* caule unifloro flore breviore. **CARLINE SANS TIGE.** Carlina acaulis magno flore albo. T.

CARTHAMUS. *cal.* ovatus, imbricatus squamis apice subovato foliaceis.

582. *Tinctorius.* foliis ovatis integris serrato-aculeatis. **CARTHAME.** **SAFFRAN BATARD.** Cnicus sativus L. carthamus officinarum. T.

CACALIA. *recept.* nudum. *pappus* pilosus. *cal.* cylindricus oblongus, basi tantum subcalyculatus.

583. *Alpina.* foliis teniformi-cordatis acutis denticulatis, calycibus subtrifloris. **CACALIA DES ALPES.** Cacalia foliis crassis & hirsutis. c. foliis cutaneis, acutioribus & glabris. T.

EUPATORIUM. *recept.* nudum. *pappus* plumbosus.

Calyx imbricatus, oblongus. *stylus semibifidus*, longus.

584. *Cannabinum*. L. T. foliis digitatis. EUPATOIRE A FEUILLES DE CHANVRE.

SANTOLINA. *recept.* paleaceum. *pappus nullus*. *calyx imbricatus*, hæmisphæricus.

585. *Chamæ cyprissus*. pedunculis unifloris, foliis quadrifariam dentatis. GARDE ROBE. Santolina foliis teretibus. T.

ATHANASIA. *recept.* palaceum. *pappus palaceus*, brevissimus. *cal.* imbricatus.

586. *Maritima*. pedunculis bifloris, foliis lanceolatis crenatis obtusis tomentosis. IMMORTELLE MARITIME. Gnaphalium maritimum. T.

Polygamia superflua.

TANACETUM. *recept.* nudum. *pappus submarginatus*.
cal. imbricatus, hemisphæricus. *cor.* radii obsoletæ, 3-fidæ (interdùm nullæ omnesque flosculi hermophroditi.)

587. *Vulgare*. foliis bipinnatis incisis serratis. TANAISIE COMMUNE. Tanacetum vulgare luteum. T.

588. *Balsamita*. foliis ovatis integris serratis. MENTHE COQ. Tanacetum hortense foliis & odore menthae. T.

ARTEMISIA. *recept.* subvillosum, vel nudiusculum.
pappus nullus. *cal.* imbricatus squamis rotundatis conniventibus. Corollæ radii nulli.

589. *Abrotanum*. fruticosa, foliis setaceis ramosissimis. AURONE MALE. Abrotanum mas angustifolium. T.

590. *Campestris*. foliis multifidis linearibus, caulinis procumbentibus virgatis. ARMOISE CHAMPETRE. Abrotanum campestre, caulinis rubentibus. T.

591. *Maritima* foliis multipartitis tomentosis, racemis cernuis, flosculis fœmineis ternis. ABSINTHE MA-

- RITIME. *Absinthium seriphium belgicum* ... germanicum ... gallicum. T.
592. *Pontica*. foliis multipartitis subtus tomentosis, floribus subrotundis nutantibus: receptaculo nudo. PETITE ABSINTHE. *Absinthium ponticum* tenuifolium incanum. T.
593. *Absinthium*. foliis compositis multifidis, floribus subglobosis pendulis: receptaculo villoso. GRANDE ABSINTHE. *Absinthium ponticum*, seu romanum officinarum, seu dioscoridis. T.
594. *Vulgaris*. foliis pinnatifidis planis incisis subtus tomentosis, racemis simplicibus recurvatis, florum radio quinquefloro. ARMOISE COMMUNE. Artemisia vulgaris major. T.
595. *Dracunculus*. foliis lanceolatis glabris integerrimis. ESTRAGON. *Abrotanum lini* folio acriori & odorato. T.
- GNAPHALIUM. Recept. nudum. *pappus plumosus. cal. imbricatus*, squamis marginalibus rotundatis, scariosis, coloratis.
596. *Stæchas*. fruticosum, foliis linearibus, corymbo-composito, ramic virgatis. IMMORTELLE JAUNE. *Elychrysum* seu *stæchas citrina* angustifolia. T.
597. *Fætidum*. herbaceum, foliis amplexicaulibus integerrimis acutis subtus tomentosis, caule ramoso. IMMORTELLE FÉTIDE. *Elychrysum africanum*, fætidissimum, amplissimo folio. T.
598. *Dioicum*. farmentis procumbentibus, caule simplicissimo, corymbo simplici terminali, floribus dioicis. PIED-DE-CHAT. *Elychrysum montanum*. T.
- CONYZA. Recept. nudum. *pappus simplex. cal. imbricatus*, subrotundus. cor. radii trifidæ.
599. *Squarrosoa*. foliis lanceolatis acutis, caule herbaeo corymboso, calycibus squarrofis. CONISE COMMUNE. *Conysa vulgaris major*. T.
- ERIGERON. Recept. nudum. *pappus pilosus. cor. radii lineares*, angustissimæ.

600. *Viscofun.* pedunculis unifloris lateralibus, foliis lanceolatis denticulatis basi reflexis, calycibus squarrosum, corollis radiatis. VERGERETIE VISCUEUSE. Virga aurea major, foliis glutinosis & graveolentibus. T.
601. *Graveolens.* foliis sublinearibus integerimis, ramis lateralibus multifloris. VERGERETTE FÉTIDE. Virga aurea minor, foliis glutinosis & grave olientibus. T
- TUSSILAGO.** *Recept.* nudum. *pappus simplex.* *cal.* squamæ æquales, discinæ æquantes, submembranaceæ.
602. *Farfara.* scapo imbricato unifloro, foliis subcordatis angulatis denticulatis. TUSSILAGE COMMUN. Tussilago vulgaris. T.
603. *Petasites.* Thyrso ovato, flosculis fœmineis nudis paucis. TUSSILAGE PETASITE. Petasites major & vulgaris T.
- SENECIO.** *Recept.* nudum. *papus simplex.* *cal.* cylindricus, calyculatus : squamis apice sphacelatis.
604. *Vulgaris.* corollis nudis, foliis pinnato-sinuatissimis amplexicaulibus, floribus sparsis. SENEÇON COMMUN. Senecio vulgaris minor. T.
605. *Abrotanifolius.* corollis radiantibus, foliis pinnato-multifidis linearibus nudis acutis, pendunculis subbifloris. SENEÇON A FEUILLES D'AURONE. Jacobæa foliis ferulaceis, flore minore. T.
606. *Jacobæa.* corollis radiatibus, foliis pinnato-lyratis, laciniis lacinulatis, caule erecto. SENEÇON-JACOBÉE. Jacobæa vulgaris laciniata. T.
- ASTER.** *Recept.* nudum. *pappus simplex.* *cor.* radii plures 10. *cal.* imbricati squamæ inferiores patentæ.
607. *Tripolium.* foliis lanceolatis integerimis carnosissimis glabris, ramis inæquatis, floribus corymbosis. ASTER MARITIME BLEU. Aster maritimus palustris, cærulæus, salicis folijs. T.

608. *Amellus*. foliis lanceolatis obtusis scabris trinerviis integris, pedunculis nudiusculis corymbosis, squamis calycinis obtusis *ASTER. EIL DE CHRIST.* Aster atticus cærulæus vulgaris. T.
- SOLIDAGO.** Recept. nudum. *pappus simplex. cor radii circiter 5. cal. squamæ imbricatae clausæ.*
609. *Canadensis*. paniculato corymbosa, racemis recurvatis, floribus adscendentibus, foliis trinerviis subferratis scabris. *VERGE D'OR DU CANADA.* Virga aurea angustifolia, panicula speciosa, Canadensis. T.
610. *Virga aurea*. caule subflexuoso angulato, racemis paniculatis erectis confertis. *VERGE D'OR COMMUNE.* Virga aurea latifolia ferrata. v. a. l. vulgaris. T.
- INULA.** Recept. nudum. *pappus simplex. antheræ basi in setas duas desinentes.*
611. *Helenium*. foliis amplexicaulibus ovatis rugosis: subtus tomentosis, calycum squamis ovatis. *AUNÉE ENULA CAMPANA.* Aster omnium maximus, helenium dictus. T.
612. *Dysenterica*. foliis amplexicaulibus cordato-oblongis subtomentosis, caule villoso paniculato, squamis calycinis setaceis. *AUNÉE ANTI-DYSENTERIQUE.* Aster pratensis autumnalis, conysæ folio. T.
613. *Crithmifolia*. foliis linearibus carnosis tricuspidatis. *LIMBARDE.* Aster maritimus, folio tereti, crasso tridentato. T.
- ARNICA.** Receptac. nudum. *pappus simplex. corollulæ radii filamentis 5 absque antheris.*
614. *Montana*. foliis ovatis integris: caulinis geminis oppositis. *BETOINE DE MONTAGNE.* Doronicum plantaginis folio alterum. T.
- DORONICUM.** Recept. nudum. *pappus simplex. cal. squamæ duplicitis ordinis æquales, disco longiores. sem. radii nuda pappo- que destituta.*

615. *Pardalianches*. foliis cordatis obtusis denticulatis : radicalibus petiolatis ; caulinis aīplexicaulibus. **DORONIC.** *Doronicum maximum* foliis caulem aīplexantibus. T.
- BELLIS. *Recept.* nudum, conicum. *pappus nullus. cal.* hemisphæricus : squamis æqualibus. *semina obovata.*
616. *Perennis*. scapo nudo. **PAQUERETTE VIVACE.** *Bellis sylvestris minor, &c.* T.
- TAGETES. *Recept.* nudum. *pappus aristis 5, erectis. cal.* 1-phyllo, 5-dentatus, tubulosus. flosculi radii 5 persistentes.
617. *Patula*. canale subdiviso patulo. **ŒILLET D'INDE.** *Tagetes indicus minor multiplicato flore.* T.
618. *Erecta*. caule simplici erecto, pedunculis nudis unifloris. **GRAND ŒILLET D'INDE.** *Tagetes maximus, rectus, flore maximo, multiplicato.* T.
- CHRYSANTHEMUM. *Receptaculum nudum. pappus nullus. cal.* hemisphæricus, imbricatus : squamis marginalibus membranaceis.
619. *Leucanthemum*. floribus aīplexicaulibus oblongis : superne ferratis, inferne dentatis. **CHRYSANTHEME COMMUN.** *Leucanthemum vulgare.* T.
- MATRICARIA. *Recept.* nudum. *pappus nullus. cal.* hemisphæricus, imbricatus : marginalibus solidis, acutiusculis.
620. *Parthenium*. foliis compositis planis : foliolis ovatis incisis, pedunculis ramosis. **MATRICAIRE ORDINAIRE.** *Matricaria vulgaris, seu sativa.* T.
621. *Chamomilla*. Receptaculis conicis, radiis patentibus, seminibus nudis, squamis calycinis margine æqualibus. **CAMOMILLE COMMUNE.** *Chamæmelum vulgare, seu leucanthemum dioscoridis.* T.
- ANTHEMIS. *Receptaculum paleaceum. pappus nullus. cal.* hemisphæricus, subæqualis. flosculi radii plures quam 5.
622. *Nobilis*. foliis pinnato-compositis linearibus acutis

subvillofis. *CAMOMILLE ROMAINE.* Chamæmelum nobile , seu lencanthemum odoratius. T.
ACHILLEA. Recept. paleaceum. *pappus* nullus. *cal.* ovatus , imbricatus. *flosculi* radii circiter 4.

623. *Ageratum.* foliis lanceolatis obtusis acute ferratis. *ACHILLIERE JAUNE ODORANTE.* Ptarmica lutea suaveolens. T.

624. *Ptarmica.* foliis lanceolatis acuminatis argute serratis. *ACHILLIERE STERNUTATOIRE.* *HERBE A ÉTERNUER.* Ptarmica vulgaris , folio loego , serrato , flore albo. T.

625. *Millefolium.* foliis bipinatis nudis : laciniis linearibus dentatis , caulis superne sulcatis. *ACHILLIERE.* *MILLEFEUILLE.* Millefolium vulgare album ... purpureum. T.

626. *Odorata.* foliis bipinnatis ovalibus nudiusculis , corymbis fastigiatis confertis. *PETITE MILLEFEUILLE ODORANTE.* Millefolium odoratum , Monspe.liense. T.

Polygamia frustranea.

HELIANTHUS. Recept. paleaceum , planum. *pappus* diphyllus. *cal.* imbricatus , subsquarrosus.

627. *Annuus.* foliis omnibus cordato-trinervatis , pendunculis incrassatis , floribus cernuis. *SOLEIL ANNUEL.* Corona solis. T.

628. *Multiflorus.* foliis inferioribus cordatis trinervatis : superioribus ovatis. *SOLEIL VIVACE.* Corona solis ramosa. T.

629. *Tuberosus.* foliis ovato-cordatis triplinervis. *SOLEIL TOPINAMBOURG.* Corona solis parvo flore , tuberosa radice. T.

CENTAUREA. Recept. setosum. *pappus* simplex. *cor.* radii infundibuliformes , longiores , irregulares.

630. *Cyanus*. calycibus ferratis , foliis linearibus integrerrimis : infimis dentatis. BLUET. BARBOT. AUBIFOIN. CASSE-LUNETTE. *Cyanus segetum* flore cæruleo . . . albo. *Cyanus hortensis* fl. simplici . . . dupli. T.
631. *Jacea*. calycibus scariosis laceris , foliis lanceolatis : radicalibus sinuato dentatis , ramis angulatis. JACÉE DES PRÉS. *Jacea nigra pratensis latifolia*. T.
632. *Benedicta*. calycibus duplicato-spinosis lanatis involucratis , foliis semi-decurrentibus denticulato-spinosis. CHARDON BÉNI. *Carduus benedictus*. T.
633. *Calcitrapa*. calycibus subduplicato-spinosis sessilibus , foliis pinuatifidis linearibus dentatis , caule piloso. CHAUSSETRAPE ÉTOILÉE. *Carduus stellatus* , sive calcitrapa. T.

Polygamia necessaria.

CALENDULA. *Recept.* nudum. *pappus nullus*. *cal.* polyphyllus æqualis. *sem.* disci membranacea.

634. *Arvensis*. seminibus cymbiformibus muricatis incurvatis : extimis erectis protenfis. SOUCI DES CHAMPS. *Caltha arvensis*. T.
635. *Officinalis*. seminibus cymbiformibus muricatis incurvatis omnibus. SOUCI DES JARDINS. *Caltha vulgaris*. T.

FILAGO. *Recept.* nudum. *pappus nullus*. *calyx imbricatus*. *flosculi fœminei* inter squamas calycis locati.

636. *Germanica*. panicula dichotoma , floribus rotundatis axillaribus hirsutis ; foliis acutis. COTONNIÈRE COMMUNE. *Filago seu impia*. T.

Monogamia.

LOBELIA. *cal.* 5-fidus. *cor.* 1-petala , irregularis. *caps.* infera , 2. s. 3-locularis.

637. *Siphilitica*. caule erecto, foliis ovato-lanceolatis subserratis, calycum sinus reflexis. CARDINALE BLEUE.
- VIOLA. *cal* 5-phyllo. *cor.* 5-petala, irregularis, postice cornuta. *caps.* supera, 3-valvis, 1-locularis.
638. *Odorata*. acaulis, foliis cordatis, stolonibus repellantibus. VIOLETTE ODORANTE. *Viola martia purpurea* (vel alba) flore simplici, odoro. T.
639. *Tricolor*. caule triquetro diffuso, foliis oblongis incisis, stipulis pinnatifidis. VIOLETTE PENSÉE.
- IMPATIENS. *cal.* 2-phyllo. *cor.* 5-petala, irregularis; nectario cucullato. *caps.* supera, 5-valvis.
640. *Balsamina*. pedunculis unifloris aggregatis, foliis lanceolatis: superioribus alternis, nectariis flore brevioribus. BALSAMINE DES JARDINS. *Balsamina fœmina*. T.
-

CLASSIS XX^a. GYNANDRIA.*Diandria.*

- O**RCHIS. *Nectarium* coniforme pone florem.
641. *Bifolia*. bulbis indivisis, nectarii labio lanceolato integrerimo: cornu longissimo, petalis patentibus: ORCHIS BLANC. *Orchis alba bifolia* (& trifolia) minor, calcari oblongo. T.
642. *Morio*. bulbis indivisis, nectarii labio quadrifido crenulato: cornu obtuso adscendente, petalis obtusis conniventibus. SATIRION FEMELLE. *Orchis morio*, fœmina. T.
643. *Mascula*. bulbis indivisis, nectarii labio quadrilobo crenulato: cornu obtuso, petalis dorsalibus reflexis. ORCHIS MALE. *Orchis morio*; mas foliis maculatis... non maculatis. T.
644. *Militaris*. bulbis indivisis, nectarii labio 5-fido

punctis scabro : cornu obtuso , petalis confluentibus. ORCHIS MILITAIRE. Orchis militaris major. T.

SATYRIUM. Nectarium scrotiforme. s. inflato-didymum pone florem.

645. *Hircinum*. bulbis indivisis , foliis lanceolatis , nectarii labio trifido. SATIRION A ODEUR DE BOUC. Orchis barbata odore hirci , breviore latioreque folio. T.

OPHRYS. Nectarium suhtus subcarinatum.

646. *Ovata*. bulbo fibroso , caule bifolio , foliis ovatis , Nectarii labio bifido. OPHRIS DOUBLE FEUILLE. Ophrys bifolia. T.

SERAPIAS. Nectarium ovatum gibbum , labio ovato.

647. *Latifolia*. bulbis fibrosis , foliis ovatis amplexicaulibus , floribus pendulis. HELLEBORINE A FEUILLES LARGES. Helleborine , latifolia , montana. T.

Pentandria.

PASSIFLORA. Trigyna. cal. 5-phyllo. Nectarium corona. bacc pedicellata.

648. *Cerulea*. foliis palmatis integerrimis. FLEUR DE LA PASSION. Granadilla polyphyllos , fructu ova-
to. T.

Hexandria.

ARISTOLOCHIA. Hexagyna. cal. o. cor. 1-petala , lingulata , integra. caps. 6-locularis , infera.

649. *Pistochia*. foliis cordatis crenulatis subtus reticulatis petiolatis , floribus solitariis. PISTOLOCHE. Aristolochia pistolochia dicta. T.

650. *Rotunda*. foliis cordatis subsessilibus obtusis, caule infirmo , floribus solitariis. ARISTOLOCHE RONDE. Aristolochia rotunda , flore ex purpura nigro . . . flore ex albo purpurascente. T.

651. *Longa*. foliis cordatis petiolatis integerrimis obtu-

siusculis , caule infirmo , floribus solitariis. ARISTOLOCHE LONGUE. Aristochia longa vera. T.

652. *Clematitidis*. foliis cordatis (petiolatis) caule erecto , floribus axillaribus confertis. ARISTOLOCHE CLÉMATITE. Aristolochia clematitis recta. T.

Dodecandraia.

CYTINUS. Monogyna. *cal.* 4-fidus , superus. *cor.* o. *antheræ* 16 , sessiles. *bacca* 8-locularis , polysperma.

653. *Hypocistis*. HYPOCISTE. Hypocistis flore luteo. T,

Polyandria.

ARUM. *Spatha* monophylla , cucullata. *Spadix* supra nudus , inferne fœmineus , medio stamineus.

654. *Dracunculus*. foliis pedatis : foliolis lanceolatis integrerrimis æquantibus spatham spadice longiorem. SERPENTAIRE. Dracunculus polyphyllus. T.

655. *Maculatum*. acaule , foliis hastatis integrerrimis , spadice clavato. PIED DE VEAU. Arum vulgare non maculatum . . . maculis candidis . . . nigris. T.

- ZOSTERA. *Spadix* linearis , altero latere fructifero. *cal.* o. *cor.* o. *stam.* alterna. *sem.* solitaria ; alterna . . .

656. *Marina*. pericarpis sessilibus. ALGUE MARINE. Alga angustifolia vitriariorum. T.

CLASSIS XXI^a. MONOCIA.

Diandria.

L EMNA Masc. *cal.* 1-phillus. *cor.* nulla.

Fem. *cal.* 1-phillus. *cor.* o. *styl.* 1. *cap.* 1-loclaris.

657. *Minor*. foliis sessilibus , utrinque planiusculis , radicibus solitariis. PETITE LENTILLE D'EAU. Lenticula palustris , vulgaris. T.

Triandria.

TYPHA. Masc. *Amentum cylindricum*. cal. obsoletus , triphyllus. cor. o.

Fem. *Amentum cylindricum* , infrà masculos. cal. capillo villoso. cor. o. sem. i , insidens pappo capillari.

658. *Latifolia*. foliis subensiformibus , spica mascula femineaque approximatis. MASSETTE A FEUILLES LARGES. *Typha palustris major*. T.

SPARGANIUM. Masc. *Amentum subrotundum*. cal. 3-phyllus. cor. o.

Fem. *Amentum subrotundum*. cal. 3-phyllus. cor. o. stigma bifidum. *Drupa exsiccata* , i-sperma.

659. *Erectum*. foliis erectis triquetris. RUBAN D'EAU REDRESSÉ. *Sparganium ramosum* non ramosum. T.

ZEA. Masc. In distictis spicis. cal. gluma 2 - flora mutica. or. gluma mutica.

Fem. Cal. gluma bivalvis. cor. gluma 2-valvis. stylus i , filiformis , pendulus. sem. solitaria , receptaculo oblongo immersa.

660. *Mays*. BLEUD DE TURQUIE. MAYS. Mays granis aureis. T.

COIX. Masc. in spicis remotis. cal. gluma 2-flora , mutica. cor. gluma mutica.

Fem. cal. gluma 2-flora. cor. gluma mutica. stylus 2 partitus. sem. calyce ossificato tectum.

661. *Lacryma*. seminibus ovatis. LARME DE JOB. Lacryma Job. T.

Tetrandria.

BETULA. Masc. *cal.* 1-phyllo, 3-fidus, 3-florus.
cor. 4-partita.

Fem. *cal.* 1-phyllo, sub 3-fidus, 2-florus.
sem. utrinque membrana alata.

662. *Alnus.* pedunculis ramosis. AULNE. BOULEAU-
VERGNE. *Alnus rotundifolia glutinosa viridis.* T.

BUXUS. Masc. *Cal.* 3-phyllo. *pet.* 2. *germinis* rudi-
mentum.

Fem. *Cal.* 4-phyllo. *petala* 3. *styli* 3. *caps.*
3-rostris, 3-locularis. *sem.* 2.

663. *Sempervirens.* BUIS. *Arborescens L.* T. *suffruticosus.*
Buxus foliis rotundioribus. T.

URTICA. Masc. *Cal.* 4-phyllo. *cor.* o. nectarium
centrale cyathiforme.

Fem. *Cal.* 2-valvis. *cor.* o. *sem.* 1, nitidum.

664. *Pilulifera.* foliis oppositis ovatis serratis, amentis
fructiferis globosis. ORTIE A PILULE. *Urtica pri-*
ma dioscoridis, semine lini. T.

665. *Urens.* foliis oppositis ovalibus. PETITE ORTIE.
Urtica urens minor. T.

666. *Dioica.* foliis oppositis cordatis, racemis geminis.
GRANDE ORTIE. *Urtica urens maxima.* T.

MORUS. Masc. *Cal.* 4-partitus. *cor.* o.
Fem. *Cal.* 4-phyllo. *cor.* o. *styli* 2. *cal.*
baccatus. *sem.* 1.

667. *Alba.* foliis oblique cordatis laevibus. MURIER
BLANC. *Morus fructu albo.* T.

668. *Nigra.* foliis cordatis scabris. MURIER NOIR. Mo-
rus fructu nigro. T.

Pentandria.

XANTHIUM. Masc. *Cal.* communis imbricatus. *cor.*
1-petalæ, 5-fidæ, infundibuli-
formes. *recept.* palaceum.

Fem. *Cal.* involucrum diphylum, 2-florum. *cor.* o. *drupa* sicca, muricata, 2-fida. *nucleus* 2-locularis.

669. *Strumarium.* caule inermi, foliis cordatis trinervatis. GLOUTERON. Xanthium. T.

AMARANTHUS. Masc. *Cal.* 3 - f. 5-phyllo. *cor.* o. *stam.* 3 - f. 5.

Fem. *Cal.* maris. *cor.* o. *styli* 3. *caps.* 1-locularis, circumscisfa *sem.* 1.

670. *Tricolor.* glomerulis triandris axillaribus subrotundis amplexicaulibus, foliis lanceolato-ovatis coloratis. AMARANTHE A TROIS COULEURS. Amaranthus folio variegato, colore hilariori, qui fœmina ... colore obscuriori sive mas. T.

671. *Blitum.* glomerulis lateralibus: floribus trifidis, foliis ovatis retusis, caule diffuso. AMARANTHE BLETTÉ. Amaranthus sylvestris & vulgaris. T.

672. *Caudatus.* racemis pentandris decompositis cylindricis pendulis longissimis. AMARANTHE A QUEUE. Amaranthus maximus. T.

Polyandria.

POTERIUM. Masc. *Cal.* 4 - phyllus. *cor.* 4 - partita. *stam.* 30 - 50.

Fem. *Cal.* 4 - phyllus. *cor.* 4 - partita. *pist.* 2. *bacca* è tubo corollæ indurato.

673. *Sanguisorba.* inerme, caulis subangulosus. PETITE PIMPRENELLE. Pimprinella sanguisorba minor hirsuta, &c. T.

QUERCUS. Masc. *Cal.* 5-fidus ferè. *cor.* o. *stam.* 5-10.

Fem. *Cal.* 1-phyllo, integerrimus scaber. *cor.* o. *styli* 2-5. *sem.* 1, ovatum.

674. *Ilex.* foliis ovato-oblongis indivisis ferratisque sub-

tus incanis, cortice integro. CHENE VERD. YEUSE.
Ilex oblongo serrato folio . . . angusto non ferrato . . . rotundiore. T.

675. *Suber*. foliis ovato-oblongis indivisis serratis subtus tomentosis ; cortice rimoſo fungoso. LIEGE. *Suber latifolium*, perpetuò virens. T.

676. *Coccifera*. foliis ovatis indivisis spinoso-dentatis utrinque glabris. CHENE DU KERMÉS. *Ilex aculeata cocciglandifera*. T.

677. *Robur*. foliis deciduis oblongis superne latioribus : Sinubus acutioribus : angulis obtusis. CHENE BLANC. *Quercus latifolia* mas quæ brevi pediculo. *Quercus* cum longo pediculo. *Quercus* foliis molli lanugine pubescentibus, &c. T.

JUGLANS. Masc. *Cal.* 1-phyllus ; squammiformis. *cor.* 6-partita, *filam.* 18.

Fem. *Cal.* 4 fidus, superus. *cor.* 4-partita. *styli* 2. *drupa* nucleo fulcato.

678. *Régia*. foliolis ovalibus glabris subserratis, subæqualibus. NOYER. *Nux juglans regia vulgaris*, &c. T.

FAGUS. Masc. *Cal.* 5-fidus, campanulatus. *cor.* 0. *flam.* 12.

Fem. *Cal.* 4-dentatus. *cor.* 0. *styli* 3. *caps.* (*calyx* anteà) muricata 4-valvis. *sem.* 2.

679. *Castanea*. foliis lanceolatis acuminato serratis subtus nudis CHATAIGNER. *Castanea sativa*. T.

680. *Sylvatica*. foliis ovatis obsolete serratis. HETRE. *Fagus*. T.

CARPINUS. Masc. *Cal.* 1-phyllus : squama ciliata. *cor.* 0. *flam.* 10.

Fem. *Cal.* 1-phyllus : squama ciliata. *cor.* 0. *germina* 2. *styli* singulis 2. *Nux* ovata.

681. *Betulus*. squamis strobilorum planis. CHARME. *Carpinus*. T.

CORYLUS. Masc. *Cal.* 1-phyllus, 3-fidus, squamifor-

mis, 1-florus cor. o. stam. 8.

Fem. Cal. 2-phyllus, lacerus. cor. o.
styli 2. nux ovata.

682. *Avelana*. stipulis ovatis obtusis. COUDRIER. NOISETIER. *Corylus sylvestris* nucibus in ramum congestis. T.

Monadelphia.

PINUS. Masc. Cal. 4-phyllus. cor. o. stam. plurimæ
antheræ nudæ.

Fem. Cal. strobili : squama 2-flora. cor. o.
pist. 1. nux ala membranacea excepta.

683. *Sylvestris*. foliis geminis, primordialibus solitariis
glabris. PIN SAUVAGE. *Pinus sylvestris vulgaris* Ge-
nevensis. T.

684. *Pinea*. foliis geminis : primordialibus solitariis ci-
liatis. PIN CULTIVÉ. *Pinus sativa* T.

685. *Larix* foliis fasciculatis obtusis. MELEZE. *Larix*
folio deciduo conifera. T.

686. *Picea*. foliis solitariis emarginatis. SAPIN ORDI-
NAIRE. *Abies taxifolio*, fructu sursum spectante.
T.

687. *Abies*. foliis solitariis subulatis mucronatis lævibus
bifaria in versis. SAPIN ÉLEVÉ. PESSE. PICEA.
Abies tenuiore folio, fructu deorsum inflexo. T.

CUPRESSUS. Masc. Cal. amenti squama. cor. o. an-
theræ 4, sessiles absque fila-
mentis.

Fem. Cal. strobili : squama 1-flora.
cor. o. styli ? puncta concava.
nux angulata.

688. *Sempervirens*. foliis imbricatis, frondibus qua-
drangulis. CYPRÉS. *Cupressus meta* in fastigium
convoluta f. fœmina. c. ramos extra le spargens
seu mas. T.

CROTON. Masc. Cal. cylindricus ; 5-dentatus : cor.
5-petala. stam. 10-15.

Fem.

Fem. *Cal.* polyphyllus. *cor.* o. *styli* 3, bifidi. *caps.* 3-locularis. *sem.* 1.

689. *Tindorium*. foliis rhombeis repandis, capsulis pendulis, caule herbaceo. FAUSSE MORELLE. Ricinoides ex quâ paratur tournesol Gallorum. T.
RICINUS. Masc. *Cal.* 5-partitus. *cor.* o. *stam.* numerosa.

Fem. *Cal.* 3-partitus. *cor.* o. *styli* 3, bifidi. *caps.* 3-locularis. *sem.* 1.

690. *Communis*. foliis peltatis subpalmatis ferratis. RICIN. PALMA-CHRISTI. Ricinus vulgaris. T.

Syngenesia:

MOMORDICA. Masc. *Cal.* 5-fidus. *cor.* 5-partita. *filamenta* 3.

Fem. *Cal.* 5-fidus. *cor.* 5-partita. *stylus* 3-fidus. *pomum* elastice dissiliens.

691. *Balsamina*. pomis angulatis tuberculatis, foliis glabris patenti-palmatis. POMME DE MERVEILLE. Momordica vulgaris. T.

692. *Elaterium*. pomis hispidis, cirrhis nullis. COMBRE SAUVAGE. Cucumis sylvestris asininus dictus. T.

CUCURBITA. Masc. *Cal.* 5-dentatus. *cor.* 5-fida. *filamenta* 3.

Fem. *Cal.* 5-dentatus. *cor.* 5-fida. *pist.* 3-fidum. *pomi semina* marginé tumido.

693. *Lagenaria*. L. T. foliis subangulatis tomentosis, basi subtus biglandulosis. pomis lignosis. CALE-BASSE. COURGE DE PELERIN.

694. *Pepo*. foliis lobatis, pomis obovatis, cirrhis septem-digitatis. COURGE. Pepo oblongus. T.

CUCUMIS. Masc. *Cal.* 5-dentatus. *cor.* 5-partita. *filamenta* 3.

Fem. *Cal.* 5-dentatus. *cor.* 5-partita. *pist.* M

- 3-fidum. *pomi* semina arguta.
695. *Colocynthis*. foliis multifidis, pomis globosis glabris.
COLOQUINTE. *Colocynthis*, fructu rotundo, major. T.
696. *Melo*. foliorum angulis rotundatis, pomis torulosis. MELON. *Melo vulgaris*. T.
697. *Sativus*. foliorum angulis rectis, pomis oblongis scabris. CONCOMBRE. *Cucumis sativus vulgaris*. T.
- BRYONIA. Masc. *Cal.* 5-dentatus. *cor.* 5-partita. filaments 3.
Fem. *Cal.* 5 dentatus. *cor.* 5-partita. *stylus* 3-fidus. *bacca* subglobosa, polysperma.
698. *Alba*. foliis palmatis utrinque calloso scabris.
BRIOINE BLANCHE. COULEUVRÉE. *Bryonia alba*, foliis rubris. T.
-

CLASSIS XXII^a. DIOCIA.*Diandria.*

- S**ALIX. Masc. *Amenti squamæ. cor.* o. *glandula* ba-
seos nectarifera.
Fem. *Amenti squamæ. cor.* o. *stylus* 2-fidus.
caps. 1-locularis, 2-valvis. *sem.* pap-
posa.
699. *Caprea*. foliis ovatis rugosis : subtus tomentosis,
undatis, superne denticulatis. SAULE MARCEAU.
Salix latifolia rotunda. f. *folio ex rotunditate acuminato*. T.
700. *Alba*. foliis lanceolatis acuminatis serratis utrinque
pubescentibus: serraturis infimis glandulosis. SAU-
LE BLANC. *Salix vulgaris alba arborescens*. T.

Triandria.

OSYRIS. Masc. *Cal.* 3-fidus. *cor.* o.

Fem. *Cal.* 3-fidus. *cor.* o. *stylus* 1. *stygma* subrotundum. *bacca* 1-loocularis.

701. *Alba.* **CASIE POÉTIQUE.** *Casia* poëtica Monspe-liensium, an Theophrasti. T.

Tetrandria.

VISCUM. Masc. *Cal.* 4-partitus. *cor.* o. *filam.* o. *anthe-*
ræ calyci adnatæ.

Fem. *Cal.* 4-phyllus, superus. *stylus* o. *cor.* o. *bacca* 1-sperma. *sem.* cordatum.

702. *Album.* foliis lanceolatis obtusis, caule dichoto-mo, spicis axillaribus. **GUI.** *Viscum baccis albis.* T.

Pentandria.

PISTACIA. Masc. *Amenti cal.* 5-fidus. *cor.* o.

Fem. *Distincta. cal.* 3-fidus. *cor.* o. *stylus* 3. *drupa* monosperma.

703. *Vera.* foliis impari pinnatis : foliolis subovatis re-curvis. **PISTACHIER.** *Terebinthus indica* Theo-phrasti, seu pistacia dioscoridis. T.

704. *Terebinthus.* foliis impari pinnatis : foliolis ovato-lanceolatis. **TEREBINTHE.** *Terebinthus vulgaris* T.

705. *Lentiscus.* foliis abruptè pinnatis : foliolis lanceo-latis. **LENTISQUE.** *Lentiscus vulgaris.* T.

SPINACIA. Masc. *Cal.* 5-partitus. *cor.* o.

Fem. *Cal.* 4-fidus. *cor.* o. *stylus* 4. *sem.* 1. intrà calycem. induratum.

706. *Oleracea.* fructibus sessilibus. **ÉPINARD.** *Spinacia mas & fœmina.* T.

CANNABIS. Masc. *Calyx* 5-partitus. *cor.* o.

Fem. *Cal.* 1-phyllus, integer, latero-

hians. cor. o. *styli* 2. *nux* 2-valvis,
intrà calycem clausum.

707. *Sativa*. foliis digitatis. CHANVRE. Cannabis mas &
fœmina. T.

HUMULUS. Masc. *Cal.* 5-phillus. cor. o.
Fem. *Cal.* 1-phillus, oblique patens,
integer. cor. o. *styli* 2. *sem.* 1. in-
trà calycem foliatum.

708. *Lupulus*. HOUBLON. Lupulus mas, & fœmina. T.

Hexandria.

TAMUS. Masc. *Cal.* 6-partitus. cor. o.

Fem. *Cal.* 6-partitus. cor. o. *stylus* 3-fidus.
bacca 3-locularis, infera. *sem.* 2.

709. *Communis*. foliis cordatis indivisis. SEAU DE NO-
TRE-DAME. Tamus racemosa flore minore luteo
pallecente. T.

SMILAX. Masc. *Cal.* 6-phillus. cor. o.

Fem. *Cal.* 6-phillus. cor. o. *styli* 3. *bacca*
3-locularis. *sem.* 2.

710. *Aspera*. Caule aculeato angulato, foliis dentato-
aculeatis cordatis novem-nerviis. SMIGUET PI-
QUANT. Smilax aspera fructu rubente. T.

Octandria.

POPULUS. Masc. *Amenti cal.* lamina lacera. cor.
turbinata, obliqua, integra.

Fem. *Amenti cal.* & cor. maris. *stygma*
4-fidum. *caps.* 2-locularis. *semina*
multa papposa.

711. *Alba*. foliis subrotundis, dentato-angulatis subtus
tomentosis. PEUPLIER BLANC. populus alba ma-
joribus . . . minoribus . . . foliis. T.

712. *Nigra*. L. T. foliis deltoidibus acuminatis serratis.
PEUPLIER NOIR. Populus nigra, foliis acumi-
natis, dentatis, ad marginem undulatis. Duhamel.
Populus italica varietas,

713. *Balsamifera*. foliis ovatis ferratis subtus albidis , stipulis resinosis. BAUMIER. TACAMAHACA. Populus nigra folio maximo , gemmis balsarium odoratissimum fundentibus. *Catesb. Carol.*

Enneandria.

- MERCURIALIS. Masc. *Cal.* 3-partitus. *cor.* o. *stam.* 9 seu 12. *antheræ globosæ* , *didymæ*.
 Fem. *Cal.* 3-partitus. *cor.* o. *styli* 2. *caps.* dicocca , 2-loocularis , 1-sperma.

714. *Annua*. caule brachiatum , foliis glabris , floribus spicatis. MERCURIALE. Mercurialis testiculata sive mas (spicata femina) dioscoridis & plinii. T.

Decandria.

- CORIARIA. Masc. *Cal.* 5-phylloides. *cor.* 5-petala calyci simillima , connexa. *antheræ bipartitæ*.
 Fem. *Cal.* 5-phylloides. *cor.* maris. *styli* 5. *sem.* 5 , petalis succulento bacca-tis tecta.

715. *Myrtifolia*. foliis ovato-oblongis. REDOU.

Monadelphia.

- JUNIPERUS. Masc. *Amenti. cal.* squamæ. *cor.* o. *stamina* 3.
 Fem. *Cal.* 3-partitus. petala 3. *styli* 3 , *bacca* 3-sperma , tribus tuberculis calycis inæqualis.

716. *Sabina*. foliis oppositis erectis decurrentibus : oppositionibus pyxidatis. SABINE. Sabina folio compressi. T.

717. *Communis*. foliis ternis patentibus mucronatis ,

bacca longioribus. GENEVRIER. Juniperus vulgaris. T.

718. *Oxycedrus*. foliis ternatis patentibus mucronatis bacca brevioribus. CADE. Juniperus major, bacca rufescente. T.

719. *Phœnicea*. foliis ternis oblitteratis imbricatis obtusis. CEDRE A FRUIT BLANC. Cedrus folio cupressi, major, fructu flavescente. T.

720. *Lycia*. foliis ternis undique imbricatis ovatis obtusis. CEDRE LYCIEN. Cedrus folio cupressi, media majoribus baccis. T.

TAXUS. Masc. *Cal.* 3-phyllus gemmæ. *cor.* o. *stam.* multa. *antheræ* peltatæ octofidæ.

Fem. *Cal.* 4-phyllus gemmæ. *cor.* o. *styli* o. *sem.* 1, calyculo baccato, integerrimo.

721. *Baccata*. foliis approximatis. IF. taxus. T.

Syngenesia.

RUSCUS. Masc. *Cal.* 6-phyllus. *cor.* o. *nectarium* centrale, ovatum, apice perforatum.

Fem. *Calyx*, *cor.* & *nectarium* maris. *stylus* 1. *bæcca* 3 locularis. *sem.* 2.

722. *Aculeatus*. foliis suprà floriferis nudis. HOUX FRELON. PETIT HOUX. Ruscus myrtifolius aculeatus. T.

723. *Hypoglossum*. foliis subtus floriferis sub foliolo. FAUX LAURIER ALEXANDRIN. Ruscus angustifolius, fructu folio innascente. T.

CLASSIS XXIII^a. POLYGAMIA.

Monœcia.

VERATRUM. Hermaphrod. *Cal.* o. *cor.* 6-petala. *stam.* 6. *pist.* 3. *caps.* 3. *polyspermæ*.

Masc.

*Cal. o. cor. 6-petala.
stam. 6. pistilli rudi-
mentum.*

724. *Album*. Racemo supradecomposito , corollis erec-
tis. HELLEBORE BLANC. Veratrum flore subviridi.
T.

VALANTIA. Hermaphrod. *Cal. o. cor. 4-partita. stam.
4. stylus 2-fidus. semen 1.*

Masc.

*Cal. o. cor. 3. f. 4-partita.
stam. 3. f. 4. pistillum ob-
foletum.*

725. *Cruciata*. floribus masculis quadrifidis , pedunculis
diphyllis. CROISSETTE VELUE. Cruciata hirsuta. T.

PARIETARIA. Hermaphrod. *Cal. 4-fidus. cor. o. stam.
4. styl. 1. sem. 1. lupe-
rum , elongatum.*

Fem.

*Cal. 4-fidus. cor. o. stam.
o. styl. 1. sem. 1. supe-
rum , elongatum.*

726. *Officinalis*. foliis lanceolato-ovatis , pedunculis
dichotomis , calycibus diphyllis. PARIETAIRE.
Parietaria officinarum & dioscoridis. T.

ATRIPLEX. Hermaphrod. *Cal. 5-phyllo. cor. o. stam.
5. stylus 2-partitus. sem. 1.
depressum.*

Fem.

*Cal. 2-phyllo. cor. o. stam.
o. stylus 2-partitus. sem. 1,
compressum.*

727. *Hortensis*. caule erecto herbaceo , foliis triangula-
ribus. ARROCHE. Atriplex hortensis alba , seu pal-
lide virens. Atr. H. rubra. T.

ACER. Hermaphr. *Cal. 5-fidus. cor. 5-petala. stam. 8.
pist. 1. caps. 2. f. 3. monospermæ ,
ala terminatæ.*

Masc.

Cal. 5-fidus. cor. 5-petala. stam. 8.

728. *Pseudo-Platanus*. foliis 5-lobis inæqualiter serra-
tis , floribus racemosis. ERABLE-SYCOMORE. Acer
montanum candidum. Acer majus foliis eleganter
variegatis. T.

- CELTIS.** Heimaphr. *Cal.* 5-partitus. *cor.* ♂. *stam.* 5.
styli 2. *drupa* 1-sperma
Masc. *Cal.* 6-partitus. *cor.* ♂. *stam.* 6.
729. *Australis.* foliis ovato-lanceolatis. MICOCOULIER.
 Celtis fructu nigricante. T.

Diœcia.

- FRAXINUS.** Hermaphr. *Cal.* ♂. f. 4-partitus. *cor.* ♂. f.
 4-petala. *stam.* 2. *pist.* 1. *sem.*
lanceolatum.
Fem. *Sem.* 1. *lanceolatum.*
730. *Excelsior.* L. T. foliolis serratis, floribus apetalis.
 FRENE.
731. *Ornus.* foliolis serratis, floribus corollatis. FRENE
 A FLEUR. *Fraxinus florifera botryoides.* T.

Triœcia.

- CERATONIA.** Hermaphr. *Cal.* 5-partitus. *cor.* ♂. *stam.*
 5. *stylus* filiformis. *legumen*
coriaceum polyspermum.
Dioica. Mas & femina distincta.
732. *Siliqua.* CAROUBIER. *Siliqua edulis.* T.
FICUS. *Receptaculum* commune turbinatum, carno-
 sum, connivens, occultans flosculos vel in-
 eodem vel distincto.
Masc. cal. 3-partitus *cor.* ♂. *stam.* 3.
Fem. cal. 5-partitus. *cor.* ♂. *pistil.* 1. *sem.* 1.
733. *Carica.* foliis palmatis. FIGUIER COMMUN. *Ficus*
communis. T.

CLASSIS XXIV^a. CRYPTOGAMIA.*Filices.*

- EQUISETUM.** *Spica* fructificationibus peltatis basi
 dehiscentibus multivalvi.

734. *Arvense*. scapo fructificante nudo ; sterili frondosor. PRELE DES CHAMPS. *Equisetum arvense* longioribus setis. T.
735. *Fluviale*. caule striato , frondibus subsimplicibus. PRELE DES RIVIERES. *Equisetum palustre* longioribus setis. T.
- OPHIOGLOSSUM. *Spica* articulata , disticha : articulis transversim dehiscentibus.
736. *Vulgatum*. L. T. fronde ovata. LANGUE DE SÉEPENT.
- OSMUNDA. *Spica* ramosa. fructificat. globosis.
737. *Regalis*. Frondibus bipinnatis , apice racemiferis. OSMONDE ROYALE. FOUGERE FLEURIE. OSMUNDA vulgaris & palustris. T.
- PTERIS. fructific. in lineis marginalibus.
738. *Aquilina*. frondibus supradecompositis : foliolis pinnatis : pinnis lanceolatis : infimis pinnatifidis : superioribus minoribus. FOUGERE FEMELLE. PTERIS AQUILIN. *Pteris ramosa* , major , pinnulis obtusis , non dentatis. T.
- ASPLENIUM. fructific. in lineolis disci frondis sparsis.
739. *Scolopendrium*. frondibus simplicibus cordato-ligulatis integerrimis , stipitibus hirsutis. SCOLOPENDRE. LANGUE DE CERF. Lingua cervina officinarum. T.
740. *Ceterach*. frondibus pinnatifidis : lobis alternis confluentibus obtusis. DORADILLE CÉTÉRACH. Asplenium sive ceterach. T.
741. *Trichomanes*. frondibus pinnatis ; pinnis subrotundis crenatis. DORADILLE POLITRIC. *Trichomanes* seu politrichum officinarum. T.
742. *Ruta muraria*. frondibus subtripinnatis : foliis alternis : pinnis lanceolatis inciso-ferratis. DORADILLE DES MURS. SAUVE VIE. *Ruta muraria*. T.
743. *Adiantum nigrum*. frondibus subtripinnatis : foliolis alternis : pinnis lanceolatis inciso ferratis. DORADILLE CAPILLAIRE. filicula quæ adianthum nigrum officinarum , pinnulis obtusioribus. T.

POLYPODIUM. *fructif.* in punctis subrotundis, sparsis per discum frondis.

744. *Vulgare.* L. T. frondibus pinnatifidis : pinnis oblongis subserratis obtusis, radice squamatâ. **POLYPODE COMMUN.** T.

745. *Filix mas.* frondibus bipinnatis : pinnis obtusis crenulatis, stipite paleaceo. **POLYPODE. FOUGERE MÂLE.** Filix non ramosa dentata. T.

746. *Filix femina.* fronde bipinnata : pinnulis lanceolatis, pinnatifidis acutis. **POLYPODE. FOUGERE FEMELLE.** Filix mollis, sive glabra, vulgari mari non ramosæ accedens. T.

747. *Aculeatum.* frondibus bipinnatis : pinnis lunulatis ciliato dentatis stipite strigoso. **POLYPODE POINTU.** Filix aculeata repens. T.

ADIANTUM. *fructificationes* in maculis terminalibus sub replicato margine frondis.

748. *Capillus veneris.* frondibus decompositis : foliis alternis : pinnis cuneiformibus lobatis pedicellatis. **CAPILLAIRÈ DE MONTPELLIER.** Adiantum foliis coriandri T.

Musci.

LYCOPODIUM. *Anthera bivalvis, sessilis. Calyptra nullâ.*

749. *Clavatum.* foliis sparsis filamentosis, spicis teretibus pedunculatis geminis. **LYCOPODE A MASSUE.** Muscus squamosus, vulgaris, repens, clavatus. T.

POLYTRICUM. *Anthera operculata, apophysi iminimæ insidens. calyptra villosa. stellæ feminea in distinèto individuo.*

750. *Commune.* caule simplici, antherâ parallelopipedâ. **POLYTRIC COMMUN. PERCE-MOUSSE.** Muscus capillaceus major, pediculo & capitulo crassioribus. T.

Algæ.

MARCHANTIA. Masc. *Cal.* peltatus , subtus tectus.
cor. 1-petalis : *antheræ* multifidæ.

Fem. *Cal.* sessilis , campanulatus ,
 polyspermus.

751. *Polymorpha.* calyce communi decemfido. **HÉPATIQUE DE FONTAINE.**

LICHEN. Masc. *Receptaculum* subrotundum , planiusculum nitidum.

Fem. *Farina* foliis adspersa.

752. *Islandicus.* foliaceus adscendens laciniatus : marginibus elevatis ciliatis. **LICHEN D'ISLANDE.**

753. *Pulmonarius.* foliaceus laciniatus obtusus glaber : suprà lacunosus ; subtus tomentosus. **LICHEN PULMONAIRE. PULMONAIRE DE CHENE.** Lichen arboreus , sive pulmonaria arborea. T.

754. *Parellus.* crustaceus albus peltis concavis obtusis pallidis. **PARELLE D'AUVERGNE.** T. It. 1. 233.
Fungi.

AGARICUS. *Fungus horizontalis* , subtus lamellosus.

755. *Quercinus.* acaulis , lamellis labyrinthiformibus. **AGARIC DE CHENE.** Agaricus dedaleis sinubus excavatus. T.

LYCOPERDON. *Fungus subrotundus* , seminibus farinaceis repletus.

756. *Tuber.* globosum solidum muricatum , radice destitutum. **TRUFFE.** Tubera. T.

757. *Bovista.* subrotundum , lacerato dehiscens. **VESSE DE LOUP COMMUNE.** Lycoperdon vulgare. T.

Palmæ.

PHŒNIX. Masc. *Cal.* 3-partitus. *cor.* 3-petala. *stam.* 3.

Fem. *Cal.* 3-partitus. *cor.* 3-petala. *pist.* 1. *drupa* ovata *dactylifera*. frondibus pinnatis : foliolis complicatis ensiformibus. **DATTIER.**

